



CATALOGUE

DES

PLANTES USUELLES,

Rangées suivant la Méthode de M. LINNEUS,

DEMONTRÉES par le fleur BANAL, fils aîné,
Jardinier - Botaniste au Jardin ██████████.

INTRODUCTION

A LA BOTANIQUE,

Contenant les principes de la méthode du système sexuel du Chevalier VON LINNÉ.

DES PLANTES

ET DE LEURS PARTIES.

TOUTES les productions qui font le sujet de notre admiration sur ce Globe terrestre, sont ou des *minéraux*,

A

ou des végétaux , ou des animaux. Ces trois regnes , à l'envi l'un de l'autre , offrent à l'homme un spectacle varié d'agrément & d'utilité. Mais , c'est sur-tout sous ce dernier point de vue qu'il nous importe de les considérer.

Le regne végétal est celui qui de tout temps a paru le plus satisfaisant à nos besoins ; en effet , c'est lui qui nous fournit le chauffage, le pain, le vin, & la plupart des autres alimens ; il contribue à notre logement, nous procure la matière nécessaire à nos habits, & dans le cas de maladie, les remèdes les plus efficaces pour les combattre.

On entend par regne végétal cette partie de l'Histoire Naturelle qui renferme les végétaux, c'est-à-dire, les plantes ; la science qui nous apprend à les connoître, se nomme *Botanique*.

La *Botanique* est donc comme *Boerhaave* l'a définie : partie de la Science naturelle, au moyen de laquelle les plantes sont le plus sûrement & le plus facilement reconnues & gravées dans la mémoire.

Par le mot plante, on entend un corps organisé attaché à la terre ou à quelqu'autre partie, d'où il tire sa nourriture. Nous en distinguons de trois sortes ; l'arbre, l'arbrisseau & l'herbe.

L'arbre est une plante des plus grandes, dont la tige est ligneuse, & qui vit long-temps ; l'arbrisseau est semblable à l'arbre, si ce n'est qu'il s'éleve moins, & qu'il produit très-souvent plusieurs tiges de la même racine ; l'herbe est une plante molle, tendre, dont la tige périt tous les ans après la maturité du fruit : on compte cinq parties dans la plupart des plantes ; la racine, la tige, les feuilles, la fleur & le fruit ; la racine est la partie de la plante par laquelle elle adhère à la terre ou à quelque autre corps, & dont l'usage est de fournir la nourriture à toutes les autres parties.

La tige prend naissance de la racine : elle est destinée à soutenir les feuilles, les fleurs & les fruits.

Les feuilles (connues de tout le monde) sont des parties ordinairement applaties, servant d'ornement aux plan-

res, qui se développent le Printemps pour tomber à l'Automne, & auxquelles rien ne succede.

La fleur est la partie de la plante qui renferme les organes de la génération; elle est composée de l'assemblage, du calice, de la corolle, de l'étamine & du pistile. Le calice est ce qui sert de soutien & d'enveloppe aux parties de la fleur: on en compte de sept especes; le *périanthe* (*perianthium*) l'*enveloppe* (*involucrum*) le *spathe* (*spatha*) la *bâle* (*gluma*) le *chaton* (*julus ou amentum*) la *coëffe* (*calyptra*) la *bourse* (*volva*).

1°. Le *périanthe* est cette espece de calice très-ordinaire composé d'une ou plusieurs feuilles, qui sert d'enveloppe à une fleur avant l'épanouissement, & de soutien après; c'est ce qu'on nomme vulgairement *bouton* dans la rose.

2°. L'*enveloppe* (*involucrum*) est une sorte de calice qui soutient plusieurs fleurs ramassées ensemble, & qui peuvent avoir chacune un périanthe particulier; ce calice est composé de plusieurs petites feuilles disposées en rayons: il se remarque principalement à la base des ombelles de la *carotte*.

3°. Le *spathe* (*spatha*) est une membrane adhérente à la tige, ouverte d'un seul côté, qui sert d'enveloppe à une ou plusieurs fleurs, privées pour l'ordinaire de périanthe, le *narcisse*.

4°. La *bâle* (*gluma*) est une espece de calice, composé de deux ou trois valvules ou écailles. Les *graminées*.

5°. Le *chaton* (*julus ou amentum*) est une sorte de filet, d'axe ou de poinçon, ressemblant en quelque sorte à la queue d'un chat; il porte un amas de fleurs *mâles* ou *féelles* presque toujours dépourvues de pétales & de calice; mais il est garni d'écailles qui y suppléent. Le *noyer*.

6°. La *coëffe* (*calyptra*) est une enveloppe mince, membraneuse, qui entoure la fructification dans plusieurs especes de *mouffes*.

7°. La *bourse* (*volva*) enveloppe épaisse qui renferme certains *champignons* avant leur développement, & qui éclate ensuite pour faire passage à la plante.

La *corolle* est ce qu'on nomme vulgairement la *fleur* ; elle environne immédiatement les parties de la génération ; il y a deux parties à la corolle, le *pétale* & le *nectar*.

Le *pétale* est cette partie ordinairement colorée, qu'on nomme *les feuilles de la fleur*.

Le *nectar* est une partie creusée à la base du pétale ; dans quelques fleurs, (*la Couronne Impériale*) ou d'une figure particulière & tout-à-fait distincte des pétales. *L'aconit*.

La troisième partie de la fleur est *l'étamine* ; c'est l'organe mâle des plantes ; elle est composée de deux parties ; le *filet* qui forme l'inférieure, & le *sommet* ou *anthere* qui constitue la supérieure ; l'usage des *étamines* est de laisser tomber la *poussière fécondante*, qui est contenue aux *antheres*, sur le *pistile*, qui la reçoit pour la transmettre aux jeunes graines pour les féconder ; la dernière partie de la fleur est le *pistile*, c'est la partie femelle des plantes, il occupe toujours le milieu de la corolle : on y considère trois parties, le *stigmat*, qui est la partie supérieure, le *stile* qui comprend la moyenne, & le *germe* qui forme l'inférieure ; il y a des pistiles sans style. Le *pavot*. Le *fruit* est la partie de la plante qui succède à la fleur : on en compte de huit espèces, savoir ; la *capsule*, la *coque*, la *silique*, la *gousse*, la *drupe*, la *pomme*, la *baye* & le *cône*.

La *capsule* est une enveloppe charnue avant sa maturité, composée de panneaux élastiques & qui se dessèchent en mûrissant. *L'alleluya*.

La *coque* diffère de la capsule en ce qu'elle est composée d'une seule pièce, qui s'ouvre du bas en haut & d'un seul côté. Le *laurier rose*.

La *silique* est un fruit composé de deux panneaux séparés par une cloison membraneuse, qui donne attache aux semences. Le *chou*.

La *gousse* diffère de la silique, en ce qu'elle n'est point divisée par une cloison. Le *pois*.

La *drupe* ou *fruit à noyau* est composé d'une chair

molle , qui renferme dans son centre une espece de boîte ligneuse qu'on nomme noyau. La *prune*.

La pomme est une espece de fruit connu de tout le monde , composé d'une pulpe , dans le milieu de laquelle on trouve des loges membraneuses qui renferment des pepins. La *poire*.

La *baye* est un fruit plein d'une pulpe molle , qui contient des pepins qui ne sont point renfermés dans des loges. Les *solanum*.

Le *cône* est un fruit composé de plusieurs écailles , appliquées les unes sur les autres, & contournées en spirale. Le *pin*.

La *semence* ou *graine* est la partie contenue dans le fruit , c'est l'œuf végétal qui , fécondé par la poussiere des étamines & couvé par la terre , produit une plante semblable à celle qui lui donne naissance : on voit de deux especes de *semences* ; de nues & aigretées.

Les *semences aigretées* sont des graines couronnées par une petite houpe de foie. Le *chardon*.

Pour faire quelque progrès dans l'étude des plantes il faut nécessairement avoir recours à une méthode , car selon M. LINNEUS , le systême est le fil d'Ariane pour les Botanistes ; sans son secours la Botanique n'est qu'un chaos : *filum Ariadneum Botanicæ est systema , sine quo chaos est res herbaria. Lin. Phil. Botan.*

Énumération des Classes du systême de M. LINNEUS.

Les Classes de la méthode du Chevalier Linné , sont établies sur les parties sexuelles des plantes : on y compte vingt-quatre Classes , dont les treize premières comprennent les fleurs visibles hermaphrodites , dont les étamines ne sont réunies par aucune de leurs parties , & n'observent entr'elles aucune proportion de grandeur.

Le nombre des étamines distingue ces treize Classes l'une de l'autre.

| <i>Noms des classes.</i> | <i>Signification.</i> | <i>N. des Cl.</i> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Monandria. | une étamine | classe 1 ^{re} . |
| Diandria. | 2 étamines | 2 ^e . |
| Triandria. | 3 étamines | 3 ^e . |
| Tetrandria. | 4 étamines. | 4 ^e . |
| Pentandria. | 5 étamines. | 5 ^e . |
| Hexandria. | 6 étamines. | 6 ^e . |
| Heptandria. | 7 étamines. | 7 ^e . |
| Octandria. | 8 étamines. | 8 ^e . |
| Enneandria. | 9 étamines. | 9 ^e . |
| Decandria. | 10 étamines. | 10 ^e . |
| Dodecandria. | 12 étamines. | 11 ^e . |
| Icofandria. | plus de 12 étamines attachées au calice. | } . . . 12 ^e . |
| Polyandria. | depuis vingt jusqu'à cent étamines, qui ne tiennent pas au calice. | } . . . 13 ^e . |

La quatorzieme & quinzieme Classe renferment des fleurs hermaphrodites, dont les étamines ne sont point réunies par aucune de leurs parties, mais dont la longueur est inégale, toujours deux plus petites opposées.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Didynamia. | 4 étamines dont deux petites. | } . . . 14 ^e . |
| Tetradynamia. | 6 étamines, dont deux petites. | } . . . 15 ^e . |

Depuis la classe 16 jusqu'à la 20^e., les fleurs sont hermaphrodites, & les étamines réunies par quelques unes de leurs parties.

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Monadelphia. | les étamines unies par les filets en un corps. | } . . . 16 ^e . |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|

| | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Diadelphia. . . | les filets des étamines unies en deux corps. | } . . . 17 ^e . |
| Polyadelphia. . . | les étamines unies en plusieurs corps par les filets. | } . . . 18 ^e . |
| Syngenesia. . . | cinq étamines unies par les sommets en forme de cylindre. | } . . . 19 ^e . |
| Gynandria. . . | les étamines portées sur le pistil. | } . . . 20 ^e . |

Les trois classes qui suivent, sont celles où les étamines sont séparées du pistil dans deux fleurs différentes.

| | | |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Monoecia. . . | fleurs mâles & femelles sur un pied. | } . . . 21 ^e . |
| Dioecia. . . | fleurs mâles & femelles sur deux pieds. | } . . . 22 ^e . |
| Polygamia. . . | fleurs mâles ou femelles avec des fleurs hermaphrodites. | } . . . 23 ^e . |

La classe 24 renferme les plantes qui n'ont point de fleurs apparentes.

| | | |
|------------------|--------------------|---------------------------|
| Cryptogamia. . . | fleurs invisibles. | } . . . 24 ^e . |
|------------------|--------------------|---------------------------|

Les ordres sont les divisions des classes : M. de Linnæus les a établis sur le nombre des pistils, pour les treize premières classes.

| | |
|---------------------|------------|
| Monogynia. | 1 pistil. |
| Digynia. | 2 pistils. |
| Trigynia. | 3 pistils. |
| Tetragynia. | 4 pistils. |
| Pentagynia. | 5 pistils. |

(8)

Hexagynia 6 pistils.

Decagynia 10 pistils.

Polygynia plusieurs pistils.

La classe quatorzieme a deux ordres, fondés sur la maniere dont les graines sont renfermées.

Gymnospermia. } 4 graines qui mûrissent à nud au fond du calice.

Angiospermia. } Les graines renfermées dans une capsule ou enveloppe, en outre du calice.

La classe quinzieme a aussi deux ordres.

Siliculosa. . . } Silicule, espece de filique orbiculaire garnie d'un file.

Siliquosa. } Silique, espece de péricarpe, composé de deux valves allongées, séparées par une cloison mitoyenne.

La dix-neuvieme classe est divisée en six ordres.

Poligamia æqualis. } tous les fleurons hermaphrodites.

Poligamia superflua. } fleurons hermaphrodites au centre, femelles à la circonférence.

Poligamia frustranea. } fleurons hermaphrodites au centre, neutres ou stériles à la circonférence.

Poligamia necessaria. } fleurs mâles au disque, femelles à la circonférence.

Poligamia segregata. } fleurons hermaphrodites munis chacun d'un calice particulier.

Monogamia. } fleurs qui ne sont point formées par des fleurons.

Les classes XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII & XXIII, établissent leurs ordres sur les nombres des étamines: on les rapporte aux treize premières classes; enfin, la dernière classe a autant de divisions qu'il y a de familles qui la composent; 1°. les fougères; 2°. les mousses; 3°. les algues; 4°. les champignons.

CLASSIS I^a. MONANDRIA.

Monogynia.

1. CANNA. *Corolla* 6-partita, erecta, labio bipartito revoluto, *stylus* lanceolatus, corolla adnatus, *calix* 3-phillus.
- Indica.* C. Foliis ovatis utrinque acuminatis, nervosis. L. *cannacorus latifolius vulgaris*, T. *le balifier* V. déterfive, apéritive.
2. SALICORNIA. *Cal.* ventriculosus integer. *Petala* 6. fem. 1.
- Fruticosa.* S. Caule erecto fruticoso. *Salicornia* articulis subæqualibus obtusis, internodiis approximatis. Ger. prov. V. diurétique, emménagogue.

CLASSIS II^a. DIANDRIA.

Monogynia.

3. JASMINUM. *Cor.* 5-fida. *Bacca* dicocca. *Sem.* arillata. *Antheræ* intrà tubum.
- Officinale.* J. Foliis oppositis: foliolis distinctis. L. *Jasmin.* *Vulgarius* flore albo. T. *le jasmin ordinaire* V. Cordiale.
4. LIGUSTRUM. *Cor.* 4-fida. *Bacca* tetrasperma

B

- Vulgare.* L. Foliis lanceolatis acutis , paniculæ pedicellis oppositis. L. T. *le troëfne.*
V. astringente déterfive.
5. PHILLIREA. *Cor.* 4-fida. *Bacca* monosperma.
Latifolia. P. Fol. ovato-cordatis ferratis. L.
Phill. latifolia spinosa. T. *le philaria.*
V. les mêmes que le troëfne.
6. OLEA. *Cor.* 4-fida : laciniis sub-ovatis. *Drupa* monosperma.
Europæa. O. Foliis lanceolatis. L.
O. fativa. T. *l'olivier.*
V. astringente, adouciffante.
7. SYRINGA. *Cor.* 4-fida. *Capsula* bilocularis.
Vulgaris. S. foliis ovato-cordatis-integris. L. T. *le lilac.*
V. astringente.
8. CIRCÆA. *Cor.* dypetala. Cal. diphyllus , superus. *sem.* 1. biloculare. L. T.
Lutetiana. C. Cæule erecto , racemis pluribus , foliis ovatis.
V. vulnéraire & déterfive.
9. VERONICA. *Cor.* limbo 4-partito , lacinia infima angustiore. *Capsula* bilocularis.
Officinalis. V. Spicis lateralibus pedunculatis , fol. oppositis , caule procumbente. L.
V. mas supina vulgatiffima. T. *la véronique* , ou *thé d'Europe.*
V. apérit. vulnér. déterf. diurétique.
- Beccabunga.* V. Racemis lateralibus , foliis ovatis planis , caule repente. L.
Veronica aquatica. T. *la véronique d'eau.*
V. apéritive , anti-scorbutique.
10. GRATIOLA. *Cor.* irregularis , resupinata. *Stamina* 2-sterilia. *Capsf.* 2-locularis. *Cal.* 7-phyl-
lus : 2-exterioribus patulis.
Officinalis. G. Foliis lanceolatis ferratis , floribus pedunculatis. L. Digitalis minima gratiola dicta T. *la gratiole.*

- V. purgative, hydragogue, vulnér. ver-
mifuge.
11. VERBENA. *Cor.* infundibulif, sub æqualis. curva.
calycis unico dente truncato, *semina* 2.
f. 4. nuda. (*stam.* 2. f. 4.)
- Officinalis.* V. Tetrandra, spicis filiformibus paniculat-
tis, fol. multifido-laciniatis, caule so-
litario. L. verb. communis flore cæruleo.
T. *la verveine* V. vulnéraire anti-hystéri-
que, fébrifuge, résolutive.
12. LYCOPUS. *Cor.* 4-fida : lacinia unica emarginata,
stamina. distantia. *semina* 4-retusa.
- Europæus* L. Foliis sinuato ferrata L.
Lycop. palustris glaber villosus. T. *le*
pied de loup. V. astringente.
13. ROSMARINUS. *Cor.* inæqualis, labio superiore
bipartito, *filamenta* longa, curva, sim-
plicia cum dente. L.
- Officinalis.* Rosm. spontaneus latiore folio, T. *le*
romarin. V. tonique, cordiale, cépha-
lique.
14. SALVIA. *Cor.* inæqualis, *filamenta* transverse pedi-
cello affixa.
- Officinalis* S. Fol. lanceolato-ovatis integris crenulatis,
flor. spicatis, calyc. acutis.
Salvia major & minor. T. *la sauge.*
V. incisive, tonique, céphalique.
- Horminum.* S. Foliis obtusis crenatis, bracteis summis
sterilibus majoribus coloratis. L.
Horminum fativum, comâ purpureo-
violaceâ. T. *l'ormin.*
V. ophtalmique diurétique.
- Vervena.* S. fol. ferratis sinuatis, læviusculis. *Cor.*
cal. angustioribus. Salvia fol. pinnatifido
sinuatis, corollæ lobis approximatis.
Horminum silvestre lavendulæ flore
T. *prud'homme.*
V. excellent vulnéraire.

- Sclarea.* S. Fol. rugosis cordatis oblongis villosis ferratis, bracteis coloratis calyce longioribus concavis accuminatis. L. *sclarea tabernæ.* T. *la toute-bonne.*
V. vulnéraire.

CLASSIS III^a. TRIANDRIA.

Monogynia.

15. VALERIANA. *Cal.* 0. *Cor.* 1-petala, basi hinc gibba, supera. *Sem.* 1.
Officinalis. V. flor. triandris, fol. omnibus pinnatis. L. V. silvestris. Major T. *la grande valériane.*
V. anti-épileptique, sudorifique, anti-histérique.
Phu. V. Floribus triandris, fol. caulinis pinnatis; radicalibus indivisis. L.
V. phu. folio olusatrici. T.
V. les mêmes que la précédente.
Locusta. V. Flor. triandris, caule dichotomo, fol. linearibus. L.
Valerianella femine umbelicato oblongo nudo. T. *La mache.*
V. rafraîchissante, calmante, anti-histérique.
16. CNEORUM. *Cal.* 3-dentatus. *petala* 3, æqualia *bacca* 3-cocca.
Tricoccon. Cneorum. L.
Chamelæa tricoccos. T. *la camelée.*
V. purgatif âcre.
17. CROCUS. *Cor.* 6-partita, æqualis. *Stigmata* convoluta.
Sativus. C. Spatha univalvi radicali, corolla tubolongissimo. L. T. *le safran.*
V. apéritive, anodine, emménagogue, résolutive.
18. IRIS. *Cor.* 6-petala, inæqualis, petalis alter-

- nis geniculato-patentibus. *Stygmata* petali formia , cucullato-bilabiata.
- Germanica.* I. barbata fol. ensi-formibus glabris , falcatis brevioribus scapo multifloro. L.
Iris hortensis latifolia, seu iris nostras. T. *la flambe.*
V. diurétique , incisive , purgative.
- Florentina.* I. barbata fol. ensiformibus glabris brevioribus scapo subbifloro. L.
Iris alba florentina. T. *l'iris de Florence.*
V. incisive , béchique.
- Pseudo-acorus.* I. Imberbis fol. ensiformibus , petalis alternis stygmate minoribus. L.
Iris , palustris lutea , five acorus adulterinus. T. *l'iris jaune des prés.*
V. purgative , hydragogue.
- Fœtida.* I. Imberbis , fol. ensiformibus , scapo unangulato. L.
Iris fœtida seu xiris. T. *le glayeur puant.*
V. apéritive , incisive , hydragogue.
- Tuberosa.* I imberbis fol. tetragonis. L.
Hermodactylus folio quadrangulo. T. *l'hermodacte.*
V. légèrement purgative.
19. CYPERUS. *glumæ* paleaceæ , distiche imbricatæ cor. o. fem. 1. nudum.
- Longus.* C. Culmo triquetro folioso , umbellâ foliosa supra-decomposita , pedunc. nudis : spicis alternis. L. *Cyperus odoratus radice longâ , seu cyperus officinarum.* T. *le fouchet.*
V. incisive , apéritive , emménagogue.

Digynia.

20. SACCHARUM. *Cal.* lanugo longa extrâ calicem ,
cor. 2-valvis.

- Officinarum.* S. Floribus paniculatis , fol. planis. L. Arundo saccharifera. T. *la canne à sucre.* V. adoucissante , béchique , anti-sceptique , nourrissante.
21. PANICUM. *Cal.* 3-valvis , valvula tertia minima.
Dactylon. P. Spicis digitatis patentibus : basi interiore villosis , Flor. solitariis. Sarmentis repentibus. L. Panicum dactylum ; radice repente. Sive officinarum. T. *Le chiendent.* V. apéritive , rafraîchissante , diurétique , anthelminthique.
- Miliaceum.* P. Panicula laxa flacida , foliorum vaginis hirtis. Glumis mucronatis nervosis , *culmus ramosus.* L. Miliium semine luteo & albo. T. *Le millet.* V. rafraîchissante , adoucissante.
22. AVENA. *Cal.* 2-valvis , multiflorus : arista dorsali contorta.
Sativa. A. Paniculata , calycib. dispermis , sem. lævibus altero aristato. L. avena nigra & alba. T. *L'avoine.* V. rafraîchissante.
23. ARONDO. *Cal.* 2-valvis. *Flosculi* congesti , lana cincti.
Donax. A. Calicibus , quinque-floris , panicula diffusa , culmo fruticoso. L. Arundo fativa quæ donax dioscoridis. T. *Le roseau.* V. apéritive , incisive , emménagogue.
24. SECALE. *Cal.* oppositus , 2-valvis , 2-florus solitarius.
Cereale. S. Glumarum ciliis scabris. L. Secal. hybernum majus & vernum minus. T. *Le seigle.* V. rafraîchissante.
25. TRITICUM. *Cal.* 2-valvis , solitarius , subtriflorus. *Flos obtusifusculus* , acutus.
Hybernum. T. Calyc. quadrifloris ventricosus levibus imbricatis submuticis. L. Tritic. hybernum aristis carens. T. *Touzeille rascalade.*

V. nourrissante.

Monococum. T. Calyc. subtrifloris : primo aristato , intermedio sterili. L. *Hordeum distichum* seu briza. T. *Le pauvre.*

V. détersive , résolutive.

26. HORDEUM. *Cal.* lateralibus , bivalvis , unifloris , ternus.

Vulgare. H. Flosculis omnibus hermaphroditis aristatis ordinibus duobus erectioribus. L. *Hordeum polystichon vernum.* T. *L'orge.*
V. adoucissante, pectorale.

Distichon. H. Flosculis lateralibus masculis muticis , sem. angularibus imbricatis. L. *Hordeum distichon* quod spica binos habet ordines. T. *La paumoule.*
V. la même.

CLASSIS IV^a. TETRANDRIA.

Monogynia.

27. GLOBULARIA. *Cal. communis* imbricatus ; proprius tubulatus , inferus , corollul. labio superiore 2-partito : inferiore 3-partito. Recept. paleaceum.

Alypum. G. Caule fruticoso foliis lanceolatis tridentatis : integrisque. L. *Globularia fruticosa myrti folio tridentato.* T. *L'herbe terrible.*

V. purgatif violent.

Vulgaris. G. Caule herbaceo , fol. radicalibus tridentatis , caulinis lanceolatis. L. T. *La globulaire.*

V. vulnéraire.

28. DIPSACUS. *Cal. communis* polyphillus ; proprius superus. Recept. paleaceum.

- Fullonum.* D. fol. sessilibus ferratis. L. *Dypsacus*, *fativus*. T. *Le chardon à foulon*.
V. apéritive, sudorifique, anti-sceptique.
- 29 SCABIOSA. *Cal. communis polyphillus*; *proprius duplex superus. recept. paleaceum*, seu nudum.
- Succisa.* Sc. corollulis quadrifidis æqualibus, caule simplici, ramis approximatis, fol. lanceolato-ovatis. L. *Scabi. folio integro hirsuto*, glabro. T. *La morsure du diable*.
V. les mêmes que la plante suivante.
- Arvensis.* S. Corollulis quadrifidis, radiantibus, fol. pinnatifidis incisis, caule hispidio. L. *Scab. pratensis hirsuta quæ officinarum*. T. *La scabieuse*.
V. alexitere, sudorifique, apéritive, détersive.
30. GALIUM. *Cor. 1-petala, plana. sem. 2-subrotunda.*
Verum. G. Foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis brevibus. L. *Gallium luteum*. T. *Le caille-lait jaune*.
V. emménagogue, anti-épileptique.
- Aparine.* G. Foliis octonis lanceolatis carinis scabris, retrorsum aculeatis, geniculis villosis, fruct. hispidis. L. *Aparine vulgaris*. T. *Le grateron*.
V. incisive, apéritive, diurétique, anti-scrophuleuse.
31. RUBIA. *Cor. 1-petala, campanulata, baccæ 2-monospermæ.*
- Tinctorium.* R. Foliis annuis, caule aculeato. L. *Rubia silvestris montepessulana major*. T. *La garance*.
V. apéritive, diurétique, emménagogue.
32. PLANTAGO. *Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida: limbo reflexo. Stamina longissima. Caps 2-ocularis circumscissa.*
- Major.* Pl. Foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis

flosculis imbricatis. L. Plan. latifolia
 sinuata. T. *Le grand plantain.*

V. astringente, vulnéraire, résolutive.

Lanceolata. Pl. Foliis lanceolatis, spica sub-ovata nuda,
 scapo angulato. L. plan. angustifolia
 major. T. *L'herbe à cinq côtes.*

Coronopifolia. Pl. Fol. linearibus dentatis, scapo tereti. L.
Coronopus hortensis. T. *La corne de*
cerf.

V. ces deux dernières espèces ont les
 mêmes vertus que la première.

Psyllum. Plan. caule ramoso herbaceo, foliis sub-
 dentatis recurvatis, capitulis aphyllis. L.
Psyllum majus supinum. T. *L'herbe aux*
puces.

V. adoucissante & rafraîchissante.

33. SANGUISORBA. Cal. 4-driphyllus. *Germen* inter
 calycem, corollamque.

Officinalis. S. Spicis ovatis. L. *Pimpinella sanguisorba*
 major. T. *La grande pimprenelle.*

V. astringente, tonique.

34. CORNUS. *Involucrum* 4-phyllum sæpius. *Petala*
 supera 4. *drupa* nucleo 2-loculari.

Mascula. C. Arborea, umbellis involucrum æquau-
 tibus. L. *Cor. hortensis mas.* T. *Le cor-*
nouillé.

V. astringente.

35. CAMPHOROSMA. Cal. urceolatus: dentibus 2-
 oppositis, alternisque minimis. Cor. nul-
 la caps. 1-sperma.

Monspelian. C. Foliis hirsutis. L. *Camph. hirsuta.* T. *Le*
camphrée.

V. apéritive, diurétique chaud.

36. ALCHEMILLA. Cal. 8-fidus. Cor. o. sem. 1.

Vulgaris. A. Foliis lobatis. L. T. *Le pied de lion.*

V. vulnéraire, détersive, astringente.

Tetragynia.

37. ILEX, Cal. 4-dentatus. Cor. rotata stilius o. bacca

C

- 4-sperma.
Aquifolium. II. Foliis ovatis acutis spinosis. L. Aquifolium vulgo, sive agrifolium. T. *Le hour.*
 V. émolliente résolutive.

CLASSIS Va. PENTANDRIA.

Monogynia.

38. HELIOTROPIUM. *Cor.* hypocrateriformis 5-fida interjectis dentibus : faucibus clausa fornicibus.
Europæum. H. Fol. ovatis integerrimis tomentosis rugosis spicis conjugatis. L. Heliotrop. majus dioscoridis. T. *L'herbe aux verrues.*
 V. fort détersive.
- 39 LITHOSPERMUM. *Cor.* infundib. fauce perforata nuda. *Cal.* 5-partitus.
Officinale. L. Seminibus levibus, corollis vix calycem superantibus, foliis lanceolatis. L. Lithos. majus erectum. T. *Le greuil.*
 V. diurétique:
40. ANCHUSA. *Cor.* infundibulif. Fauce clausa fornicibus *sem.* basi insculpta.
Officinalis. A. Foliis lanceolatis, spicis imbricatis secundis. L. Buglossum angustifolium majus flore albo & cæruleo. T. *La buglose.*
 V. diurétique, apéritive, tempérante, &c.
- Tinctoria.* A. Tomentosa, fol. lanceolatis obtusis, stamin. corolla brevioribus. L. Buglossum radice rubra, sive anchusa vulgatiores floribus cæruleis. T. *L'orcanette.*
 V. astringente.
- 41 CINOGLOSSUM. *Cor.* infundibuliform. fauce clausa fornicibus. *Semina* depressa, interiore

tantum latere stylo affixa.

Officinale. C. Staminibus corolla brevioribus, fol. lato-lanceolatis tomentosis sessilibus. L. Cynogl. majus vulgare. T. *La langue de chien.*

V. rafraîchissante, pectorale, émolliente, astringente.

42. PULMONARIA. *Cor.* infundibulif. fauce perviâ. *Cal.* prismatico 5-gonus.

Officinalis. P. Fol. radicalibus ovato-cordatis, scabris. L. pulmonaria italorum ad buglossum accedens. T. *La pulmonaire.*

V. adoucissante vulnéraire & consolidante.

43. SYMPHITUM. Corollæ limbus tubulato-ventricosus : fauce clausâ radiis subulatis.

Officinale. S. Foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. L. Symphitum consolida major. T. *La grande consoude.*

V. incrassante, vulnéraire, astringente.

44. BORRAGO. *Corolla* rotata, fauce radiis clausâ.

Officinalis. B. Foliis omnibus alternis, calycibus patentibus. L. Borrage floribus cæruleis. T. *La bourrache.*

V. apéritive, diaphorétique, adoucissante, expectorante.

45. ECHIUM. *Cor.* irregularis, fauce nuda.

Vulgare. E. Caule tuberculato-hispido, fol. caulinis lanceolatis hispidis, flor. spicatis lateralibus. L. T. *La vipérine.*

V. les vertus de la Buglose, mais moindres.

46. PRIMULA. *Involucr.* umbellulæ. *Corollæ* tubus cylindricus; ore patulo.

Veris. P. Foliis dentatis rugosis. L. primula-veris odorata flore luteo simplici. T. *La prime-vère.*

V. nervine, cordiale, céphalique.

Auricula. P. Fol. ferratis glabris. L. Auricula ursi.

- T. *L'oreille d'ours*.
V. vulnéraire.
47. CYCLAMEN. *Cor. rotata, reflexa, tubo brevissimo: fauce prominente. Bacca tecta capsula.*
Europæum. C. *Corolla retro-flexa.* L. T. *Le pain de pourceau.*
V. purgatif âcre.
48. MENYANTHES. *Cor. hirsuta. Stigma 2-fidum caps. 1-ocularis.*
Trifoliata. M. *Fol. ternatis.* L. T. *Le tréfle d'eau.*
V. incisive, diurétique, fébrifuge.
49. LYSIMACHIA. *Cor. rotata. Caps. globosa, mucronata, 10-valvis.*
Vulgaris. L. *Paniculata; racemis terminalibus.* L. *Lysimachia lutea major.* T. *La corneille.*
V. astringente, vulnéraire.
- Nummularia.* L. *Fol. subcordatis, flor. solitariis, caule repente.* L. *Lysimach. humifusa, folio rotundiore, flore luteo.* T. *L'herbe aux écus.*
V. astringente, vulnéraire.
50. ANAGALLIS. *Cor. rotata. caps. circumscissa.*
Arvensis. A. *Foliis indivisis, caule procumbente.* L. *Anagall. phæniceo flore & ceruleo.* T. *Le mouron.*
V. détersive, vulnéraire, céphalique.
51. PLUMBAGO. *Cor. infundibulif. Stamina squamis basin corollæ claudentibus inserta. Stigma. 5-fidum sem. 1, oblongum, tunicatum.*
Europæa. Pl. *Foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris.* L. *Plumbago quorundam.* T. *La dentelairé.*
V. on s'en sert contre la gale.
52. CONVULVULUS. *Cor. campanulata, plicata. Stigmata 2-caps. 2-ocularis: loculis dispermis.*
Arvensis. C. *Foliis sagittatis utrinque acutis, pedunculis subunifloris.* L. T. *Le petit liseron.*
V. vulnéraire.

- Sepium.* C. Foliis sagittatis postice truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. L. Convolvulus major albus. T. *Le grand liferon.*
V. purgative & résolutive.
- Scammonia.* C. Fol. Sagittatis postice truncatis, pedunc. teretibus subtrifloris. L. Scammonia fyriaca. T. *La scammonée.*
V. purgative.
- Soldanella.* C. Fol. reniformibus, pedunc. unifloris. L. Convolvulus maritimus nostras rotundifolius. T. *Le chou marin.*
V. purgative, hydragogue.
53. CAMPANULA. Cor. campanulata fundo clauso valvis staminiferis, *stigm.* 3-fidum. Caps. inferas poris lateralibus dehiscens.
- Rapunculus.* C. Fol. undulatis : radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata. L. Campanula radice esculenta flore cæruleo. T. *La raiponce.*
V. rafraîchissante.
54. SAMOLUS. Cor. hypocrateriformis. Stamina munita squamulis corollæ. Caps. 1-locularis, infera.
- Valerandi.* S. L. & T. *Le mouron d'eau.*
V. anti-scorbutique, vulnéraire.
55. LONICERA. Cor. monopetala, irregularis, *bacca* polysperma, 2-locularis, infera.
- Caprifolium.* L. Floribus verticillatis terminalibus sessilibus, fol. summis connato-perfoliatis. L. Caprifolium : italicum. T. *Lechevre-feuille.*
V. diurétique, détersive.
56. MIRABILIS. Cor. infundibul. supera. cal. inferus. *nectarium* globosum, germen includens.
- Jalappa.* M. Floribus congestis terminalibus erectis. L. Jalappa fructu rugoso. T. *Jalap ou belle de nuit.*
V. purgative, hydragogue.
57. CORIS. Cor. monopetala, irregularis cal. spinosus caps. 5-valvis, supera.

- Monspeliensis*. C. L. coris cærulea maritima. T.
V. déterfive, vulnéraire.
58. VERBASCUM. Cor. rotata, subinequalis. Caps. 1-
locularis, 2-valvis.
- Thapsus*. V. Foliis decurrentibus utrinque tomentosis,
caule simplici. L. Verbascum mas lati-
folium luteum. T. *Le bouillon blanc*.
V. anodin. anti-spasmodique, emollient.
- Nigrum*. V. Fol. cordato-oblongis petiolatis. L. Ver-
bascum nigrum flore exluteo purpuraf-
cente. T.
V. emolliente, anti-hémorrhoidale.
- Blattaria*. V. Fol. amplexicaulibus oblongis glabris,
pedunc. folitariis. L. Blattaria lutea folio
longo laciniato. T. *L'herbe aux mites*.
59. DATURA. Cor. infundib. plicata, cal. tubulosus,
angulatus, deciduus, caps 4-valvis.
- Stramonium*. D. Pericarpis spinosis erectis ovatis, fol.
ovatis glabris. L. Stramonium fativum.
T. *L'endormie*.
V. anti-épileptique, céphalique.
60. HYOSCYAMUS. Cor. infundibl. obtusa *stam.* incli-
nata caps. operculata, 2-locularis.
- Niger*. H. Foliis amplexicaulibus sinuatis, floribus
sessilibus. L. Hyoscyamus vulgaris &
niger. T. *La jusquiame noire*.
V. émolliente, résolutive.
- Albus*. H. Fol. petiolatis sinuatis obtusis, flor. ses-
silibus. L. Hyosc. albus major. T. *La
jusquiame ordinaire*.
V. les mêmes que la précédente.
61. NICOTIANA. Cor. infundibul. limbo plicato, *stam.*
inclinata caps. 2-valvis, 2-locularis.
- Tabacum*. N. Foliis lanceolato-ovatis sessilibus decur-
rentibus, floribus acutis. L. Nicotiana
major. T. *Le tabac*.
V. vomitive, sternutatoire, anodine,
vulnéraire.
- Rustica*. N. Fol. petiolatis ovatis integerrimis, flor.

- obtusif. L. *Nicotiana minor*. T. *La priapée*.
 V. les mêmes que la précédente.
62. ATROPA. *Cor.* campanulata. *flam.* distantia. *Bacca* globosa, 2-ocularis.
Mandragora. A. *Acaulis*, scapis unifloris. L. *Mandragora fructu rotundo*. T. *La mandragore*.
 V. assoupissante, narcotique.
- Belladonna*. A. *Caule herbaceo*, fol. ovatis integris. L. *Belladonna majoribus foliis & floribus*. T. *La mandragore*.
 V. anti-cancéreuse.
63. PHYSALIS. *Cor.* rotata, *flam.* conniventia. *Bacca* intra calycem inflatum, bilocularis.
Alkekengi. P. *Fol. geminis integris acutis*, caule herbaceo inferne subramoso. L. *Alkekengi officinarum*. T. *L'alkekenge ou le coque-ret*.
 V. apéritive, diurétique, adoucissante.
64. SOLANUM. *Cor.* rotata. *antheræ* subcoalitæ, apice porogemino dehiscentes, *bacca.* 2-ocularis.
Dulcamara. S. *Caule inermi frutescente flexuoso*, fol. superioribus hastatis, racemis cymosis. L. *Solan. scandens seu dulcamara*. T. *La douce-amere*.
 V. vulnéraire, anti-scorbutique.
- Nigrum*. S. *Caule inermi herbaceo*, fol. ovatis dentato angulatis, racemis distichis nutantibus. L. *Solanum officinarum acinis nigricantibus*. T. *La morele*.
 V. anodine, résolutive.
- Lycopersicum*. S. *Caule inermi herbaceo*, foliis pinnatis incisifs, racemis simplicibus. L. *Lycopersicum galeni*. T. *La pomme-d'amour*.
 V. les mêmes que la précédente.
- Insanum*. S. *Caule aculeato herbaceo*, fol. ovatis tomentosis, pedunculis pendulis incrassatis calyc. aculeatis. L. *Tragum hor-*

tense , *Rumph. aubergine.*
V. calmante , anodine.

65. CAPSICUM. *Cor. rotata bacca exsucca.*

Annum. C. Caule herbaceo , pedunculis solitariis.
L. capsicum filiquis recurvis propendentibus. T. *Le corail de jardin.*
V. échauffante.

66. RHAMNUS. *Cal. tubulosus : squamis stamina munitibus. Cor. nulla. Bacca.*

Catharticus. R. Spinis terminalibus , floribus quadrifidis dioicis foliis ovatis , caule erecto. L. T. *Le nerprum.*

V. purgative , hydragogue.

Zizyphus. R. Aculeis geminatis : altero recurvo , flor. digynis , fol. ovato-oblongis. L. *Zizyphus.* T. *Le jujubier.*
V. béchique.

67. EVONYMUS. *Cor. 5-petala. Caps. 5-gona 5-que locularis , 5-valvis , colorata. sem. calyptrata.*

Europæus. E. Flor. plerisque quadrifidis , flor. sessilibus. L. *evonymus vulgaris granis rubentibus.* T. *Le fusain ou bonnet de Prêtre.*
V. purgative.

68. RIBES. *Petala 5. & stamina calyci inserta. stylus 2-fidus bacca polysperma infera.*

Rubrum. R. Inerme , racemis glabris pendulis , floribus planiusculis. L. *Grossularia multiplici acino seu non spinosa hortensis, sive ribes officinarum.* T. *Le groseiller rouge.*
V. rafraîchissante.

Nigrum. R. Inerme , racem. pilosis , flor. oblongis. L. *Grossularia non spinosa fructu nigro.* T. *Le cassis.*
V. diurétique.

69. HEDERA. *Petala 5. Oblonga. Bacca 5. Sperma calyce cincta.*

Helix. H. Foliis ovatis lobatisque. L. *Hedera arbor.* T. *Le lierre ordinaire.*

V.

- V. vulnéraire.
70. VITIS. *Pétala* apice coherentia , emarcida.
Bacca 5-sperma , supera.
- Vinifera.* V. Foliis lobatis sinuatis nudis. L. T. *La vigne.*
 V. astringente , adoucissante.
71. VINCA. Contorta. *Folliculi* 2 , erecti , *semina* nuda.
- Major.* V. Caulibus erectis , fol. ovatis , flor. pedunculatis. L. *Pervinca vulgaris latifolia flore carneleo.* T. *La pervanche.*
 V. astringente & vulnéraire.
72. NERIUM. Contorta. *Folliculi* 2 , erecti. *Sem.* plumosa *Cor.* tubus terminatus corona lacera.
- Oleander.* N. Foliis lineari-lanceolatis ternis , corollis coronatis. L. *Nerium floribus rubescentibus.* T. *Laurier rose.*
 V. résolutive.

Digynia.

73. CYNANCHUM. Contorta. *nectarium* cylindricum 5-dentatum.
- Monspeliacum.* C. Caule volubili herbaceo , foliis reniformi-cordatis acutis. L. *Periploca monspeliaca foliis rotundioribus.* T. *La scamonée de Montpellier.*
 V. purgative.
74. ASCLEPIAS. Contorta. *nectaria* 5 , ovata , concava , corniculum exferentia.
- Vincetoxicum.* A. Fol. ovatis basi barbatis , caule erecto , umbell. proliferis. L. *Asclepias flore albo.* T. *Le dompte-vénin.*
 V. sudorifique , diurétique , emménagogue.
75. HERNIARIA. *Cal.* 5-partitus. *Cpr.* o. *Stamina* 5-

D.

- sterilia. *Caps.* 1-sperma.
- Glabra.* H. *Glabra.* L. T. *La turquette ou herniaire.*
V. astringente, vulnéraire, diurétique.
- Hirsuta.* H. *Hirsuta.* L. T.
V. les mêmes que la précédente.
76. CHENOPODIUM. *Cal.* 5-phyllus, 5-gonus, *Cor.* o.
sem. 1. lenticulare, superum.
- Bonushenricus.* C. *Foliis* triangulari-sagittatis integerrimis,
spicis compositis aphillis axillaribus. L. *Chenopodium folio triangulo.* T. *Le bon henri.*
V. rafraîchissante, humectante, vulnéraire.
- Botrys.* C. *Foliis* oblongis sinuatis, racem, nudis multifidis. L. *Chenopodium ambrosioides folio sinuato.* T. *Le piment.*
V. incisive, carminative.
- Ambrosioides.* C. *Fol.* lanceolatis dentatis, racem. foliatis simplicibus. L. *Chenop. ambrosioides maximum.* T. *Thé du mexique.*
V. sudorifique, diurétique, emménagogue.
- Vulvaria.* C. *Fol.* integerrimis romboïdeo-ovatis, flor. conglomeratis axillaribus. L. *Chenopodium foetidum.* T. *Arroche puante.*
V. anti-histérique.
77. BETA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Sem.* reniforme, intra substantiam baseos calycis.
- Vulgaris.* B. *Floribus* congestis. *Calycis foliola basi dentata.* L. T. *La poirée.*
V. adoucissante, émolliente, apéritive.
78. SALSOLA. *Cal.* 5-phyllus, *cor.* o. *Caps.* 1-sperma. *sem.* cochleatum.
- Soda.* S. *Herbacea*, patula, fol. inermibus. L. *Kalimajus cochleato semine.* T. *La soude.*
V. apéritive.
79. ULMUS. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Bacca* exsucca, compresso-membranacea.

- Campestris.* U. Foliis duplicato-ferratis : basi inequalibus. L. T. *L'ormeau.*
V. astringente , vulnéraire.
80. GENTIANA. *Cor.* monopetala caps. 2-valvis. 1-ocularis. *Receptaculis* 2 , longitudinalibus.
- Lutea.* G. Corollis subquinquefidis rotatis verticillatis , calycibus spathaceis. L. *Gentiana major lutea.* T. *La grande gentiane.*
V. tonique , stomachique , anthelmentique.
- Centaurium.* G. Coroll. 5-fidis infundibuliformibus , caule dichotomo , pistillo simplici. L. *Centaurium minus.* T. *La petite centaurée.*
V. incisive , apéritive , stomachique.
81. ERYNGIUM. *Flores* capitati , *receptaculum* paleaceum.
- Campestre.* E. Fol. radicalibus amplexicaulibus pinnato-lanceolatis. L. *Eryngium vulgare.* T. *Le panicaut ou chardon roulant.*
V. apéritive , diurétique , emménagogue.
82. SANICULA. *Umbellæ* confertæ sub capitate. *Fructus* scaber. *flores* disci abortientes.
- Europæa.* S. Foliis radicalibus simplicibus flosculis omnibus sessilibus. L. *Sanicula officinarum.* T. *La sanicle.*
V. astringente , détersive , vulnéraire.
83. ASTRANTIA. *Involucra partialia* , lanceolata , patentia , æqualia , longiora , colorata. *Flores* plurimi abortientes.
- Major.* A. Foliis quinquelobis : lobis trifidis. L. T. V. purgative.
84. BUPLEVRUM. *Involucra* umbellulæ majora. 5-phylla pet. involuta. *Fructus* subrotundus , compressus , striatus.
- Rotundifolium.* B. *Involucris* universalibus nullis , foliis perfoliatis. L. *Buplevrum perfoliatum* , rotundifolium , annuum. T. *Le perce-feuille.*
V. astringente , vulnéraire.

85. TORDYLIUM. *Cor.* radiatæ , omnes hermaphroditæ. *Fructus* suborbiculatus , margine crenatus. *Involucra* longa indivisa.

Officinale. T. *Involuc.* partialibus longitudine florum , foliolis ovatis laciniatis. L. *Tordylium* Narbonense minus. T. *Le fefeli de crête.* V. diurétique , emménagogue.

86. DAUCUS. *Corollæ* subradiatæ , omnes hermaphroditæ. *Fructus* pilis hispidis.

Carota. D. *Seminibus* hispidis , petiolis subtus nervosis. L. *Daucus* sativus. T. *La carotte.* V. diurétique , carminative , emménagogue.

87 AMMI. *Involucra* pinnatifida. *Corollæ* radiatæ : omnes hermaphroditæ. *Fructus* lævis.

Majus. A. *Foliis* inferioribus pinnatis lanceolatis ferratis ; superioribus multifidis linearibus. L. T. *L'ammi.*

V. semence diurétique , carminative , incisive.

88. BUNIUM. *Corolla* uniformis. *Umbella* conferta. *Fructus* ovati.

Bulbocastanum. *Bunium.* L. *Bulbocastanum* majus folio apii. T. *La terre-noix.* V. astringente.

89. CONIUM. *Involucella* dimidiata subtriphylla. *Fructus* subglobosus , 5-friatus , utrinque crenatus.

Maculatum. C. *Seminibus* friatis. L. *Cicuta* major. T. *La cigüe.*

V. anti-cancéreuse , anti-écrouelleuse , &c.

90. ATHAMANTHA. *Fructus* ovato-oblongus friatus. *Pet.* inflexa emarginata.

Libanotis. A. *Foliis* bipinnatis planis , umbella hemispherica , seminibus hirsutis. L. *Oreoselinum* apii folio majus. T. *Le percil de montagne.*

V. détersive , diurétique.

- Cretensis.* A. Foliolis linearibus planis hirsutis , pet. bipartitis , semin. oblongis hirsutis. L. Myrrhis annua semine striato incano. T. V. carminative , diurétique , emménagogue.
91. PEUCEDANUM. *Fructus* ovatus , utrinque striatus , ala cinctus. *Involucra* brevissima. *Officinale.* P. Foliis quinquies tripartitis filiformibus , linearibus. L. Peucedanum germanicum. T. *Le fenouil de porc.* V. apéritive , diurétique , béchique.
92. CRITHMUM. *Fructus* ovalis , compressus. *Flosculi* æquales. *Maritimum.* C. Foliolis lanceolatis carnosis. L. Crithmum , seu fœniculum maritimum minus. T. *Le fenouil de mer.* V. apéritive , diurétique , emménagogue.
93. FERULA. *Fructus* ovalis , compresso-planus , striis utrinque 3. *Communis.* F. Foliolis linearibus longissimis simplicibus. L. Ferula fœmina plinii. T. *La ferule.* V. astringente , céphalique , sudorifique.
94. LASERPITIUM. *Fructus* oblongus : angulis 8. membranaceis. *Pet.* inflexa , emarginata , patentia. *Siler.* L. Foliol. ovali-lanceolatis integerrimis petiolatis. L. Ligusticum quod seseli officinarum. T. *Le percil de montagne.* V. carminative , diurétique , emménagogue.
95. HERACLEUM. *Fructus* ellipticus , emarginatus , compressus , striatus , marginatus. *Cor.* difformis , inflexo-emarginata. *Involucrum* caducum. *Sphondylium.* H. Foliolis pinnatifidis lævibus , flor. uniformibus. L. Sphondilium vulgare hirsutum. T. *La berce.*

- V. diurétique , anti-épileptique.
96. **LIGUSTICUM.** *Fructus* oblongus , 5-sulcatus utrinque. *Corollæ* æquales. *Petalis* involutis , integris.
- Levisicum.* L. Foliis multiplicibus : foliolis superne incisis. L. Angelica montana perennis palud-apii folio. T. *La Liveche* ou *ache de montagne.*
V. carminative , emménagogue.
97. **ANGELICA.** *Fructus* subrotundus , angulatus , solidus , stylis reflexis. *Corollæ* æquales : petalis incurvis.
- Archangelica.* A. Foliorum impari lobato. L. Imperatoria fativa. T. *L'angélique.*
V. cordiale , sudorifique , stomachique , alexipharmaque.
- SIUM.** *Fructus.* Subovatus , striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata.
- Nodiflorum.* S. Foliis pinnatis , umbellis axillaribus sessilibus. L. Sium aquaticum procumbens ad alas floridum. T. *La berle.*
V. diurétique , anti-scorbutique , résolutive.
- Sifarum.* S. Fol. pinnatis : floralibus ternatis. L. Sifarum germanorum. T. *Le chervi.*
V. apéritive , vulnéraire.
98. **BUBON.** *Fructus* ovatus , striatus , villosus.
- Macedonicum.* B. Foliolis rhombeo-ovatis crenatis , umbellis numerosissimis. L. Apium macedonicum. T. *Le percil de macédoine.*
V. diurétique , carminative , emménagogue.
99. **ÆNANTHE.** *Flosculi* difformes : indisco sessiles , steriles. *Fructus* calyce & pistillo coronatus.
- Crocata.* Æ. Foliis omnibus multifidis obtusis subæqualibus. L. Ænanthe chærophilli foliis. T.
V. elle est regardée comme poison.

- Pimpinelloïdes.* ☉. Foliolis radicalibus cuneatis fissis; caulinis integris linearibus longissimis simplicibus. L. *Ænanthe apii* folio. T.
100. PHELLANDRIUM. *Flosculi* disci minores, *Fructus* ovatus lævis coronatus perianthio & pistillo.
- Aquaticum.* P. Foliorum ramificationibus divaricatis. L. T. *La ciguë d'eau.*
V. c'est un poison violent.
- 101 ÆTHUSA. *Involucella* dimidiata, 3-phylla, pendula. *Fructus* striatus.
- Cynapium.* Æ. Foliis conformibus. L. *Cicuta minor petroselino simili.* T. *La petite ciguë.*
V. poison.
- Meum.* Æ. Foliis omnibus multi partito setaceis. L. *Meum foliis anethi.* T. *Le meum.*
V. carminative, emménagogue, fébrifuge.
102. CORIANDRUM. *Cor.* radiata: *pet.* inflexo-emarginata. *Involucr.* universale monophyllum: *partialia* dimidiata. *Fructus* sphaericus.
- Sativum.* C. *Fructibus* globosis. L. T. *La coriandre.*
V. stomachique, carminative.
103. SCANDIX. *Cor.* radiata. *Fructus* subulatus. *Petala* emarginata. *Flosculi* disci sæpe masculi.
- Odorata.* S. Seminibus sulcatis angulatis. L. *Myrrhis major seu cicutaria odorata.* T. *Le cerfeuil musqué.*
V. emménagogue, alexitere.
- Cereseolum.* S. Semin. nitidis ovato-subulatis, umbellis sessilibus lateralibus. L. *Chærophyl- lum sativum.* T. *Le cerfeuil.*
V. incisive, apéritive, diurétique, emménagogue.
104. CHÆROPHYLLUM. *Involucr.* reflexum, concavum. *Petala.* inflexo-cordata. *Fructus* oblongus lævis.
- Sylvestre.* C. Caule lævi striato, geniculis tumidiuf-

- culis. L. *charophyllum sylvestre perenne cicutæ folio*. T. *Le cerfeuil sauvage*.
V. anti-gangreneuse.
105. IMPERATORIA. *Fructus* subrotundus, compressus, medio gibbus, margine cinctus. *Petala* inflexo-marginata.
- Ostruthium*. Imperatoria. L. *Imperatoria major*. T. *L'imperatoire*.
V. carminative, sudorifique, emménagogue.
106. SESELI. *Umbellæ globosæ. Involucr.* foliolo uno alterove. *Fructus* ovatus striatus.
- Tortuosum*. S. *Caule* alto rigido, foliol. linearibus fasciculatis. L. *Fæniculum tortuosum*. T. *Le seseli de Marseille*.
V. carminative, incisive.
107. THAPSIA. *Fructus* oblongus, membrana cinctus. *Villosa*. T. *Foliolis* dentatis, villosis, basi coadunatis. L. *Thapsia latifolia villosa*. T. *La malherbe*.
V. purgatif d'angereux & très-âcre.
108. PASTINACA. *Fructus* ellipticus, compresso-planus. *Petala* involuta, integra.
- Sativa*. P. *Foliis* simpliciter pinnatis. L. T. *Le panai*.
V. diurétique, emménagogue, fébrifuge.
- Opoponax*. P. *Fol.* pinnatis : foliolis basi antica excisis. L. *Panax costinum*. T.
V. incisive, carminative, résolutive.
109. SMYRNIUM. *Fructus* oblongus, striatus. *Petala* acuminata, carinata.
- Olusatrum*. S. *Fol.* caulinis ternatis petiolatis ferratis. L. *Smyrniium mathyoli*. T. *Le maceron*.
V. apéritive, diurétique, emménagogue.
110. ANETHUM. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Pet.* involuta, integra.
- Graveolens*. A. *Fructibus* compressis. L. *Anethum hortense*.

tense. T. *Le fenouil.*

V. incisive , apéritive , diurétique , sudorifique , &c.

111. CARUM. *Fructus* ovato-oblongus, striatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* carinata , inflexo-emarginato.

Carvi.

Carum. L. T. *Le carvi.*

V. carminative , fébrifuge.

112. PIMPINELLA. *Fructus* ovato-oblongus. *Petala* inflexa. *stigm.* subglobosa.

Saxifraga. P. Foliis pinnatis : foliolis radicalibus subrotundis : summis linearibus. L. *Tragoselinum umbella rubente.* T. *La bouquettine.*

V. anti-histérique.

Anisum. P. Fol. radicalibus trifidis incisifs. *Involucella depauperata.* L. T. *L'anis.*

V. carminative.

113. APIUM. *Fructus* ovatus , striatus. *Involucr.* 1-phyllum. *Petala* æqualia.

Petroselinum. A. Foliis caulinis linearibus , involucellis minutis. L. *apium hortense vulgo petroselinum.* T. *Le persil.*

V. diurétique , apéritive , emménagogue , résolutive.

Graveolens. A. Fol. caulinis cuneiformibus. L. *Apium palustre seu officinarum.* T. *Le céleri.*

V. diurétique , carminative , sudorifique.

114. ÆGOPODIUM. *Fructus* ovato-oblongus , striatus.

Podagraria. Æ. Fol. caulinis summis ternatis. L. *Angelica sylvestris minor seu erratica.* T. *L'herbe à gerard.*

V. vulnéraire : on l'estime pour la goutte.

Trigynia.

15. RHUS. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *bacca* 1-sperma.

Coriaria. R. Foliis pinnatis obtusiuscule serratis ovalibus , subtus villosis. L. *Rhus folio*

- ulmi. *Le sumac.*
V. astringente.
116. VIBURNUM. *Cal.* 5-partitus, *superus.* *Cor.* 5-fida. *Bacca* 1-sperma.
- Tinus.* V. Foliis integerrimis ovatis : ramificationibus venarum subtus villosoglandulosis. L. *Tinus prior.* T. *Le laurier-tin.*
V. purgatif violent.
- Lantana.* V. Fol. cordatis ferratis venosis, subtus tomentosis. L. *Viburnum vulgo.* T. *La viorne.*
V. astringente.
117. SAMBUCUS. *Cal.* 5-partitus, *cor.* 5-fida. *Bacca* 3-sperma.
- Ebulus.* S. Cymis tripartitis, stipulis foliaceis, caule herbaceo. L. *Samb. humilis* sive *ebulus.* T. *L'hièble.*
V. Purgative, hydragogue.
- Nigra.* S. Cymis 5-partitis, fol. pinnatis, foliis subovatis ferratis. Caule arboreo. L. *sambucus fructu in umbella nigro.* T. *Le sureau.*
V. purgative, hydragogue.
118. TAMARIX. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. caps. 1. locularis, 3-valvis. *Semina* paposa.
- Gallica.* T. Floribus pentandris. L. *Tamariscus Narbonensis.* T. *Le tamarix.*
V. apèritive.
119. ALSINE. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. æqualia. caps. 1-locularis, 3-valvis.
- Media.* A. Petalis bipartitis, foliis ovato-cordatis. L. T. *La morgeline.*
V. rafraîchissante, humectante, adouçissante.

Tetragynia.

120. STATICE. *Cal.* 1-phyllus, integer, plicatus, scariosus. *Petala* 5. *Sem.* 1. superum.

Limonium. S. Scapo paniculato tereti, fol. lævibus
 enerviis, subtus mucronatis. L. *Limonium*
maritimum majus. T. *Le béhen*
rouge.

V. astringente.

121. LINUM. Cal. 5-phyllus. Petala 5. Caps. 5. Valvis
 10-ocularis. Sem. solitaria.

Usitatissimum. L. Calycibus capsulisque mucronatis, pe-
 talis crenatis, foliis lanceolatis alternis,
 caule subfolitario. L. *Linum arvense* &
fativum. T. *Le lin*.

V. adoucissante, émolliente.

Catharticum. L. Foliis oppositis ovato-lanceolatis, caule
 dichotomo, corollis acutis. L. *Linum*
pratense flosculis exiguis. T. *Le lin ca-*
thartique.

V. purgative.

CLÀSSIS VI^a. HEXANDRIA.

Monogynia.

122. NARCISSUS. Pet. 6, æqualia : nectario infundibu-
 liformi, 1-phylo. Stam. intra nectarium.

Pseudonarcissus. N. Spatha uniflora ; nectario campanula-
 to erecto crispo, æquante petala ovata.

L. *Narciss. sylvestris pallidus* calyce lu-
 teo. T. *Le narcisse*.

V. purgative.

123. PANCRATIUM. Petala 6. Nectario 12-fido. Stam.
 nectario imposita.

Maritimum. P. Spatha multiflora, petalis planis, fol.
 lingulatis. L. *Narcissus maritimus*. T.

Le narcisse de mer.

V. incisive, atténuante, apéritive.

124. ALLIUM. Cor. 6-partita spatha multiflora umbella

- congesta. *Capsf. supera.*
- Porrum.** A. Caule planifolio umbellifero ; stamin. tricuspидatis , radice tunicata. L. Porrum commune capitatum , latifolium & sativum. T. *Le porreau.*
V. incisive , diurétique , emménagogue.
- Sativum.** A. Caule planifolio bulbifero , bulbo composito , stamin. tricuspидatis L. T. *L'ail d'usage.*
V. diurétique , anthelmentique , alexipharmaque.
- Scorodoprasum.** A. Caule planifolio bulbifero , fol. ereulatis , vaginis ancipitibus , stamin. tricuspидatis. L. Allium sativum alterum feu allio prasum caulis summo circumvoluto. T. *La rocambole.*
V. les mêmes qu'à Poignon.
- Ascalonicum.** A. Scapo nudo tereti , fol. subulatis , umbella globosa , stamin. tricuspидatis. L. Cepa scalonica. T. *Les échalottes.*
- Cepa.** A. Scapo nudo inferne ventricoso longiore foliis teretibus. L. Cepa vulgaris. T. *L'oignon.*
V. diurétique , incisive , anti-scorbutique.
- Fistulosum.** A. Scapo nudo adæquante folia teretia ventricosa. L. cepa oblonga. T. *La ciboule.*
V. les mêmes que l'oignon.
- 125. LILIUM.** *Cor. 6-petala , campanulata : linea longitudinali nectarifera. Capsf. valvulis pilo cancellato connexis.*
- Candidum.** L. Foliis sparsis , corollis campanulatis : intus glabris. L. Liliium vulgare flore albo. T. *Le lys.*
V. anodine , émolliente , résolutive.
- 126. SCILLA.** *Cor. 6-petala , patens , decidua. Filamenta filiformia.*
- Maritima.** S. Nudiflora. Bracteis refractis. L. Ornithogalum maritimum five scilla radice rubra. T. *La squille.*

- V. incisive , atténuante , apéritive.
127. ASPHODELUS. *Cor.* 6-partita. *Nectarium* exvalvulis 6 germen tegentibus.
- Ramosus.* A. Caule nudo , fol. ensiformibus carinatis , lævibus. L. *Asphodelus albus ramosus* & non ramosus. T. *L'asphodèle.*
V. diurétique , emménagogue.
128. ASPARAGUS. *Cor.* 6-partita , erecta : *petalis* 3-bus interioribus apice reflexis. *Bacca* 3-locularis 2-sperma.
- Officinalis.* A. Caule herbaceo tereti erecto , foliis fetaceis , stipulis paribus. L. T. *L'asperge de jardin.*
V. diurétique.
- Acutifolius.* A. Caule inermi angulato fruticoso , foliis aciformibus , rigidulis , perennantibus mucronatis æqualibus. L. T. *L'asperge sauvage.*
V. diurétique.
129. CONVALLARIA. *Cor.* 6-fida. *Bacca* maculosa , 3-locularis.
- Majalis.* C. Scaponudo. L. *Lilium convallium album.* T. *Le lis des vallées.*
V. anti-épileptique.
- Polygonatum.* C. Foliis alternis , amplexicaulibus , caule ancipiti pedunculis axillaribus subunifloris. L. *Polygonatum vulgare latifolium.* T. *Le sceau de Salomon.*
V. détersive , astringente.
130. ALOE. *Corolla* erecta , ore patulo , fundo nectarifero. *Filamenta* receptaculo inserta.
- Perfoliata vera.* A. Floribus corymbosis cernuis pedunculatis subcylindricis. L. *Aloe vulgaris.* T. *L'aloës succotrin.*
V. stomachique , balsamique , vulnéraire , purgative.
131. HEMEROCALIS. *Cor.* campanulata : tubo cylindrico. *Stam.* declinata.
- Flava.* H. Fol. lineari-subulatis carinatis corollis-

- flavis. L. Lilio asphodelus luteo flore. T.
Le lys asphodele.
 V. anodine, émolliente, résolutive.
132. ACORUS. *Spadix cylindricus, tectus flosculis. Cor. 6-petalæ nudæ. Stylus nullus. Caps. 3-locularis.*
Calamus. Acorus. L. Calamus aromaticus. T. *Le jonc odorant.*
 V. stomachique, carminative, emménagogue.
133. BERBERIS. *Cal. 6-phyllus. Petala 6 : ad ungues glandulis 2. Stylus 0. Bacca 2-sperma.*
Vulgaris. B. Pedunculis racemosis-spinis triplicibus.
 L. Berberis dumetorum. T. *L'épine-vinette.*
 V. rafraîchissante, anti-septique.

Trigynia.

134. RUMEX. *Cal. 3-phyllus. Petala. 3-conniventia. Sem. 1, triquetrum.*
Patientia. R. Floribus hermaphroditis : valvulis integerrimis : unica granifera. Foliis ovato-lanceolatis. L. Lapathum hortense folio oblongo. T. *La patience.*
 V. laxative, tonique.
- Acutus.* R. Flor. hermaphroditis : valvulis dentatis graniferis. Fol. cordato-oblongis acuminatis. L. Lapathum folio acuto-plano. T.
 V. racine apéritive, tonique.
- Aquaticus.* R. Flor. hermaphroditis. Valvulis integerrimis nudis, fol. cordatis glabris acutis. L. Lapathum aquaticum folio cubitali. T.
 V. les mêmes que la précédente.
- Scutatus.* R. Flor. hermaphroditis, fol. cordato-hastatis, caule tereti. L. Acetosa rotundifolia. T. *L'oseille ronde.*

- Acetosa.* R. V. rafraîchissante , anti-scorbutique.
 R. Floribus dioicis , Fol. oblongis sagitatis.
 L. *Acetosa pratensis.* T. *L'oseille.*
 V. rafraîchissante , astringente.
- Acetofella.* R. Flor. dioicis , fol. lanceolato-hastatis. L.
Acetosa arvensis lanceolata. T. *L'oseille*
sauvage.
 V. cordiale , alexitère , astringente.
135. COLCHICUM. *Spatha.* Cor. 6-partita : tubo radi-
 cato. *Capsulæ* 3-connexe inflatæ.
- Autumnale.* C. Foliis planis lanceolatis erectis. L. Col-
 chicum commune. T. *Le colchique ou*
rue chien.
 V. très-âcre.

Poligynia.

136. ALISMA. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 3. *Sem.* plura.
- Plantago.* A. Foliis ovatis acutis , fructibus obtuse
 trigonis. L. *Ranunculus palustris plan-*
taginis folio ampliore. T. *Le plantain*
d'eau.
 V. lythomtriptique.
- Damaconium.* A. Fol. cordato-oblongis , flor. exhagynis.
Caps. subulatis. L. *Damaconium stella-*
tum. T.
 V. astringente , détersive , rafraîchissante.

CLASSIS VII_a. HEPTANDRIA.

Monogynia.

137. ÆSCULUS. *Cal.* 1-phyllus , 5-dentatus , ventrico-
 sus. *Cor.* 5-petala , inæqualiter colorata ,
 calici inserta. *Caps.* 3-locularis.
- Hippo-casanum.* Æ. Floribus heptandris. L. *Hippo-cas-*

tanum. T. *Le marronnier d'Inde.*
V. sternutatoire , fébrifuge.

CLASSIS VIIIa. OCTANDRIA.

Monogynia.

138. TROPEOLUM. *Cal.* monophyllus , calcaratus ,
petala 5. Inæqualia. *Baccæ* 3 , sicca.
Majus. T. Foliis peltatis subquinelobis , petalis
obtusis. L. *Cardamindum ampliorifolio*
& majori flore. T. *La capucine.*
V. anti-scorbutique.
139. ERICA. *Calix* 4-phyllus. *Cor.* 4-fida. *Filamenta*
receptaculo inserta. *Antheræ* bifidæ.
Capsula 4-locularis.
Vulgaris. E. Antheris aristatis , corollis campanulatis
subæqualibus , calicibus duplicatis , foliis
oppositis sagittatis. L. T. *La bruyere.*
V. diurétique , alexitère.
140. DAPHNÉ. *Cal.* o. *Cor.* 4-fida , corollacæa , marces-
cens , stamina includens. *Bacca* 1-sperma.
Mezereum. D. Floribus sessilibus ternis caulinis , fol.
lanceolatis deciduis. L. *Thymelea folio*
deciduo. T. *Le bois gentil.*
Laureola. D. Racem. axillaribus quinquefloris , fol.
lanceolatis glabris. L. *Thymelea lauri-*
folia semper virens seu laureola mas. T.
La lauréole mâle.
Gnidium. D. Panicula terminali , fol. lineari-lanceo-
latis acuminatis. L. *Thymelæa foliis lini.*
T. *Le trinanel ou garrou.*
Ces trois especes font de violens
purgatifs.

Trigynia.

141. POLYGONUM. *Cal.* o. *Cor.* 5-partita , calycina.
Sem.

- Sem. I. angulatum.*
- Bistorta.** P. Caule simplicissimo monosthachio, fol. ovatis in petiolum decurrentibus. L. Bistorta major, radice minus intorta. T. *La bistorte.*
V. astringente.
- Hydropiper.** P. Flor. hexandris semidigynis, fol. lanceolatis, stipul. submuticis. L. *Perficaria urens* seu hydro-piper. T. *Le poivre d'eau.*
V. Vulnéraire, détersive.
- Perficaria.** P. Flor. hexandris digynis, spicis ovato-oblongis, fol. lanceolatis, stipulis ciliatis. L. *Perficaria mitis maculosa* & non. T. *La persicaire.*
V. astringente, détersive, vulnéraire.
- Ayiculare.** P. Flor. octandris trigynis axillaribus, fol. lanceolatis, caule procumbente herbaceo. L. *Polygonum latifolium.* T. *La renouée.*
V. astringente, vulnéraire.
- Fagopyrum.** P. Fol. cordato-sagittatis. Caule erectiusculo inerimi, feminum angulis æqualibus. L. *Fagopyrum erectum.* T. *Le bled noir* ou *sarrasin.*
V. détersive, résolutive, apéritive.

 CLASSIS IX^a. ENNEANDRIA.

Monogynia.

142. LAURUS. Cal. o. Cor. calycina, 6-partita. Nectarium glandulis 3, bifetis, germen cingentibus. Filamenta interiora glandulifera. Drupa 1-sperma.
- Nobilis.** L. Fol. lanceolatis-venosis perennantibus, flor. 4-fidis. L. *Laurus vulgaris.* T. *Le laurier.*

F

V- résolutive, carminative.

Trigynia.

143. RHEUM. *Cal. o. Cor. 6-fida, persistens. Sem. 1, triquetrum.*
Rhaponticum. R. Fol. glabris, petiolis subfulcatis. L. Rhabarbarum dioscoridis. T. Le rapontic.
Rhabarbarum. R. Fol. subvillosis, petiolis æqualibus. L. T. La rhubarbe.
Palmatum. R. Fol. palmatis acuminatis. L. La vraie rhubarbe.
 V. ces trois especes sont purgatives, apéritives, toniques.

 CLASSIS X^a. DECANDRIA.
Monogynia.

144. ANAGYRIS. *Vexillum. alæque carina breviores in corolla papilionacea. Le gumen.*
Fœtida. Anagyris. L. T. Le bois puant.
 V. résolutive, émétique.
145. CERCIS. *Cal. 5-dentatus, inferne gibbus. Cor. papilionacea : vexillo sub alis brevi. Legumen.*
Siliquastrum. C. Foliis cordato-orbiculatis glabris. L. T. Le guainier ou arbre de Judas.
 V. astringente.
146. CASSIA. *Cal. 5-phyllus. Petala 5. Antheræ supene 3-steriles, infimæ tres rostratæ. Legumen.*
Senna. C. Fol. sejugis subovatis, petiolis eglandulatis. L. Senna alexandrina & italica. T. Le Séné.

- V. purgative , anthelmentique.
147. **DICTAMNUS.** *Cal.* 5-phyllus petala 5 , patula.
Filamenta punctis glandulosis adspersa.
Capsf. 5-que coalitæ.
- Albus.* D. Foliis pinnatis , caule simplici. L. *Fraxinella.* T. *Le dictame blanc ou la fraxinelle.*
V. emménagogue , cordiale , vermifuge.
148. **RUTA.** *Cal.* 5-partitus petala concava. *Receptac.* punctis melliferis decem cinctum. *Capsf.* lobata.
- Graveolens.* R. Foliis decompositis , floribus lateralibus 4-fidis. L. *Ruta sylvestris major.* T. *La rue.*
V. incisive , anti-hystérique , vermifuge , emménagogue.
149. **TRIBULUS.** *Cal.* 5-partitus. *Pet.* 5 , patentia styl. o. *Capsf.* 5, gibbæ , spinosæ , polyspermæ.
- Terrestis.* T. Foliis subsexjugis subæqualibus seminibus quadricornibus. L. T. *La croix de malthe.*
V. détersive , apéritive.
- ARBUTUS.** *Cal.* 5-partitus. *Cor.* ovata : ore basi pelucida. *Bacca* 5-ocularis.
- Uva ursi.* A. Caul. procumbentibus fol. integerrimis. L. *Uva ursi.* T. *La boufferole.*
V. lythomtriptique.
150. **PYROLA.** *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Capsf.* 5-ocularis angulis dehiscens.
- Rotundifolia.* P. *Staminibus* ascendentibus , pistillo declinato. L. T. *La pyrole.*
V. vulnéraire , astringente.

Digynia.

151. **SAXIFRAGA.** *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Capsf.* 2-rostris , 1-ocularis , polysperma.
- Granulata.* S. Fol. caulinis reniformibus lobatis , caul.

- ramoso, radice granulata. L. saxifraga rotundifolia. T. *La saxifrage*.
V. diurétique, lythomtriptique.
152. SAPONARIA. Cal. 1-phyllus, nudus. Petala 5, unguiculata. Caps. oblonga, unilocularis.
Officinalis. S. Calic. cylindricis, fol. ovato-lanceolatis. L. Lychnis quæ saponaria vulgo. T. *La saponaire*.
V. diurétique, emménagogue, déterfive.
153. DIANTHUS. Cal. cylindricus, 1-phyllus: basi squamis 4. Petala 5, unguiculata. Caps. cylindrica, 1-locularis.
Caryophyllus. D. Flor. solit. squamis calycinis binis subovatis brevissimis, corollis crenatis. L. Caryophyllus hortensis. T. *L'œillet*.
V. cordiale, sudorifique, alexipharmaque.

Trigynia.

154. CUCUBALUS. Cal. inflatus. Petala 5, unguiculata, absque corona ad faucem. Caps. 3-locularis.
Behen. C. Calyc. subglobosis glabris reticulato-venosis. Caps. 3-locularibus, coroll. subnudis. L. Lychnis sylvestris quæ behen album vulgo. T. *Le behen blanc*.
V. alexitere, aphrodisiaque, anthelmentique.

Pentagynia.

155. COTYLEDON. Cal. 5-fidus. Cor. 1-petala, squamæ nectariferæ 5, ad basim germinis. Caps. 5.
Umbilicus. C. Fol. cucullato-peltatis, serrato-dentatis, alternis, caule ramoso, flor. erectis.

- L. Cotyl. major. T. *Le nombril de Venus.*
 V. rafraîchissante , humectante.
156. SEDUM. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5 , ad basin germinis. *Capsf.* 5.
- Telephium.* S. Fol. planiusculis serratis , corymbo folioso , caule erecto. L. *Anacampteros prima.* T. *L'orpin* ou *reprise.*
 V. on s'en sert pour les panaris & les hémorrhoides.
- Rupestre.* S. Fol. subulatis quinquefariis confertis basi solutis , flor. cymosis. L. *Sedum minus luteum folio acuto* , T. *Le triquemadame.*
 V. humectante , rafraîchissante.
- Acre.* S. Fol. subovatis adnato-fessilibus gibis erectiusculis alternis , cyma trifida. L. *Sedum parvum acre flore luteo.* T. *La vermiculere brûlante.*
 V. anti-scorbutique.
157. OXALIS. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Capsf.* angulis dehiscens , 5-gona.
- Corniculata.* O. Caule decumbente herbaceo , pedunculis umbelliferis. L. *Oxalis flore flavo.* T. *L'alleluia* ou *pain à coucou.*
 V. anti-scorbutique , rafraîchissante.

Decagynia.

158. PHYTOLACCA. *Cal.* 0. *Petala* 5. *Calycina.* *Bacca.* supera , 10-ocularis , 10-sperma.
- Decandra.* P. Flor. decandris decagynis. L. *Phytolacca americanam majori fructu.* T.
 V. on applique ses feuilles sur le cancer.

 CLASSIS XI^a. DODECANDRIA.

Monogynia.

159. ASARUM. *Cal.* 3-f. 4-fidus , germine infideus. *Cor.*

- nulla. *Capsf.* coriacea, coronata.
Europæum. A. Foliis reniformibus obtusis binis. L. T.
Le cabaret ou oreille d'homme.
 V. purgative, emménagogue, sternu-
 tatoire.
160. PORTULACA. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 2-fidus, *capsf.*
 1-ocularis, circumscissa, aut trivalvis.
- Oleracea.* P. Foliis cuneiformibus, flor. sessilibus. *Capsf.*
circumscissa. L. *Portulaca angustifolia*
fylvestris. T. *Le pourpier.*
 V. rafraîchissante, anti-scorbutique.
161. LYTHRUM. *Cal.* 12-fidus. *Petala* 6, calyci inserta.
Capsf. 2-ocularis, polysperma.
- Salicaria.* L. Foliis oppositis cordato-lanceolatis, flo-
 ribus spicatis dodecandris. L. *Salicaria*
vulgaris purpurea foliis oblongis. T. *La*
salicaire.
 V. astringente, vulnéraire.

Digynia.

162. AGRIMONIA. *Cal.* 5-dentatus, altero obvallatus.
Petala 5. *Sem.* 2, infundo calycis.
- Eupatoria.* A. Foliis caulinis pinnatis : impari-petiolato,
 Fructibus hispidis. L. *Agrimonia officina-*
lis. T. *L'aigremoine.*
 V. apéritive, détersive, hépatique, af-
 tringente.

Trigynia.

163. RESEDA. *Cal.* 1-phyllus, partitus. *Petala* laciniata.
Capsf. ore dehiscens, 1-ocularis.
- Luteola.* R. Foliis lanceolatis integris basi utrinque
 1-dentatis, calycibus 4-fidis. L. *Luteola*
herba falicis folia. T. *La gaude.*
 V. alexitére, apéritive.
164. EUPHORBIA. *Cor.* 4-f. 5-petala, calyci infidens.

- Cal.* 1-phyllus , ventricosus. *Caps.* 3-cocca.
- Officinarum.* E. Aculeata nuda multangularis : aculeis geminatis. L. T. *L'euphorbe.*
- Lathyris.* E. Umbella 4-fida : dichotoma , foliis oppositis integerrimis. L. *Tithymalus cataputia* dictus. T. *L'épurga.*
- Efula.* E. Umbella multifida : bifida , involucell. subcordatis , petalis subbicornibus , ramis sterilibus , fol. uniformibus. L. *Tithymalus foliis pini*, forte *dioscoridis*. T. V. ces trois especes sont violemment purgatives.

Dodecagynia.

- SEMPERVIVUM. *Cal.* 12-partitus. *Petala* 12. *Caps.* 12 , polyspermæ.
- Tectorum.* S. Foliis ciliatis , propaginibus patentibus. L. *semper vivum majus vulgare*. T. *La joubarbe.*
V. *rafraichissante.*

CLASSIS XII^a. ICOSANDRIA.

Monogynia.

165. CACTUS. *Cal.* monophyllus , superus , imbricatus. *Cor.* multiplex. *Bacca* 1-ocularis , polysperma.
- Opuntia.* C. Articulato-prolifer laxus , articulis ovatis , spinis setaceis. L. *Opuntia vulgo herbariorum*. T. *La raquette.*
V. *rafraichissante.*
166. MYRTHUS. *Calix* 5-fidus , superus. *Petala* 5.

- Bacca* 2-f. 3-sperma.
Communis. M. Floribus solitariis : involucro diphylo.
 L. T. *Le myrthe.*
 V. astringente.
167. PUNICA. *Cal.* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum*
 multiloculare, polyspermum.
Granatum. P. Foliis lanceolatis, caule arborco. L.
Malus punica sylvestris. T. *Le grenadier.*
 V. astringente.
168. AMYGDALUS. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Petala* 5.
Drupa nuce poris perforata.
Persica. A. Foliiorum ferraturis omnibus acutis, flo-
 ribus sessilibus solitariis. L. *Persica molli*
carne & vulgaris. T. *Le pêcher.*
 V. apéritive, laxative, anthelmentique.
- Communis.* A. Fol. ferraturis infimis glandulosis, flor.
 sessilibus geminis. L. *Amygdalus fativa.*
 T. *L'amandier.*
 V. adoucissante, laxative.
169. PRUNUS. *Cal.* 5-fidus, inferus, *petala* 5: *Drupa*
nux futuris prominulis.
Lauro-cerasus. P. Flor. racemosis, fol. semper virenti-
 bus dorso biglandulosis. L. *laurocerasus.*
 T. *Le laurier cerise.*
 V. un peu astringente, stomachique.
- Mahaleb.* P. Flor. corymbosis terminalibus, fol. ova-
 tis. L. *Cerasus mahaleb putata.* T. *Le*
malagué.
 V. émolliente, atténuante, résolutive.
- Armeniaca.* P. Flor. sessilibus, fol. subcordatis. L. *Ar-*
meniaca fructu majore. T. *L'abricotier.*
 V. humectante, adoucissante.
- Cerasus.* P. Umbellis sub pedunculatis, fol. ovato-
 lanceolatis glabris conduplicatis. L. *Ce-*
rasus fativa. T. *Le cerisier.*
 V. tempérante, rafraîchissante.
- Domestica.* P. Pedunculis subsolitariis, fol. lanceolato-
 ovatis convolutis, ramis muticis. L. T.
Le prunier.

- Spinosa.* V. humectante , purgative , laxative.
 P. Pedunculis solitariis , fol. lanceolatis ,
 glabris , ramis spinosis. L. Prunus syl-
 vestrus. T. *Le prunellier.*
 V. astringente.

Digynia.

170. CRATÆGUS. Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca infera ,
 2-sperma.
Oxyacantha. C. Fol. obtusis subtrifidis ferratis. L. Mes-
 pilus apii folio sylvestris spinosa. T.
L'aubepin.
 V. astringente.

Trigynia.

171. SORBUS. Cal. 5-fidus. Petala 5. Bacca infera , 3-
 sperma.
Domestica. S. Fol. pinnatis , subtus villosis. L. sorbus
 fativa. T. *Le cormier ou sorbier.*
 V. astringente.

Pentagynia.

172. MESPILUS. Cal. 5-fidus , petala 5. Bacca infera ,
 5-sperma.
Germanica. M. Inermis , fol. lanceolatis subtus tomen-
 tosis , flor. solitariis sessilibus. L. Mesp.
 germanica folio laurino non serrato. T.
Le néflier.
 V. astringente.
 173. PYRUS. Cal. 5-fidus. Petala 5. Pomum inferum
 5-loculare , polyspermum.
Communis. P. Foliis ferratis lævibus , floribus corym-
 bosis. L. Pyrus sylvestris. T. *Le poirier.*
 V. astringente.

- Malus.* P. Fol. ferratis , umbellis sessilibus. L. *Malus sylvestris.* T. *Le pommier.*
V. tempérante , rafraîchissante.
- Cydonia.* P. Fol. integerrimis , flor. solitariis. L. *Cydonia vulgaris.* T. *Le coignassier.*
V. astringente.
174. SPIRÆA. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Capf.* polyspermæ.
Filipendula. S. Fol. interrupte pinnatis : foliolis linearilanceolatis interrupte ferratis glaberrimis , flor. cymosis. L. *Filipendula vulgaris.* T. *La filipendule.*
V. diurétique , astringente.
- Ulmaria.* S. Fol. interrupte pinnatis : foliolis ovatis biferratis subtuscanis , flor. cymosis. L. *Ulmaria clusii.* T. *La Reine des près.*
V. fébrifuge.

Polygynia.

175. ROSA. *Petala* 5. *calix* urceolatus , 5-fidus , carnosus , collo coarctatus. *Sem.* plurima , hispida , calycis interiori lateri affixa.
- Canina.* R. Germin. ovatis pedunculisque glabris , caule petiolisque aculeatis. L. *Rosa sylvestris vulgaris* flore odorato , incarnato. T. *Le chinnorodon.*
V. laxative , un peu astringente.
- Centifolia.* R. Germin. ovatis pedunculisque hispidis , caule hispido aculeato , petiolis inermibus. L. *Rosa rubra simplex & multiplex.* T. *La rose de provins.*
V. astringente , détersive.
176. RUBUS. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *bacca* composita acinis monospermis.
- Ydeus.* R. Fol. quinato-pinnatis ternatisque , caule aculeato , petiol. canaliculatis. L. T. *Le framboisier.*
V. humectante , rafraîchissante.

- Fruticosus.* R. Fol. quinato digitatis ternatisque , caule petiolisque aculeatis. L. Rubus vulgaris fructu nigro. T. *Le ronce.*
V. déterfivè , astringente.
177. FRAGARIA. *Cal.* 10-fidus , *petala* 5. *receptaculum* seminum ovatum , baccatum deciduum.
Vesca. F. Flagellis reptantibus. L. Fragaria vulgaris. T. *Le fraiser.*
V. rafraichissante , apéritive , diurétique.
178. POTENTILLA. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *sem.* subrotunda , nuda , receptaculo parvo exsucco affixa.
Anserina. P. Fol. pinnatis ferratis , caule repente , pedunculis 1-floris. L. Pentaphylloides argenteum alatum seu potentilla. T. *L'argentine.*
V. elle est en usage dans les fleurs blanches.
- Reptans.* P. Fol. quinatis , caule repente , pedunculis unifloris. L. Quinquefolium majus repens luteum. T. *La quintefeuille.*
V. astringente , vulnéraire.
179. TORMENTILLA. *Cal.* 8-fidus. *Petala* 4. *sem.* rotunda , nuda , receptaculo parvo exsucco affixa.
Erecta. T. Caule erectiusculo , foliis sessilibus. L. Tormentilla sylvestris. T. *La tormentille.*
V. astringente.
180. GEUM. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *sem.* arista geniculata.
Urbanum. G. Flor. erectis , fructibus globosis villosis ; aristis uncinatis nudis , foliis lyratis. L. Cariophyllata vulgaris. T. *La benoite.*
V. fébrifuge & astringente.

CLASSIS XIII^a. POLYANDRIA.

Monogynia.

181. CAPPARIS. *Cal.* 4-phyllus , coriaceus. *Petala* 4.

- stam. longa. *Bacca corticosa*, unilocularis, pedunculata.
- Spinosa.* C. Pedunculis unifloris solitariis, stipulis spinosis, foliis annuis capsul. ovalibus. L. T. *Le caprier.*
V. apéritive, diurétique, tonique.
182. ACTÆA. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-phyllus. *Bacca unilocularis sem.* semi orbiculata.
- Spicata.* A. Racemo ovato fructibus baccatis. L. Christo phoriana vulgaris & americana. T. *L'herbe de St. Christophe.*
V. sudorifique & échauffante.
183. CHELIDONIUM. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Siliqua* 1-locularis linearis.
- Majus.* C. Pedunculis umbellatis. L. T. *La chélideine ou éclairé.*
V. apéritive, diurétique, sudorifique, détersive.
- Glaucium.* C. Pedunculis unifloris, fol. amplexicaulis finuatis, caule glabro. L. *Glaucium flore luteo.* T. *Le pavot cornu.*
V. diurétique, vulnéraire, détersive.
184. PAPAVER. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 2-phyllus. *Capsula* 1-locularis, sub stigmate persistente poris dehiscens.
- Rheas.* P. Caps. glabris globosis, caule piloso multifloro, fol. pinnatifidis incisifs. L. *Papaver erraticum majus.* T. *Le coquelico.*
V. adoucissante, anodine, diaphorétique.
- Somniferum.* P. Calyc. capsulisque glabris, fol. amplexicaulis incisifs. L. *Papaver hortense*, femine nigro & albo. T. *Le pavot blanc.*
V. narcotique.
- NYMPHÆA. *Cor.* polypetala. *Cal.* 4-seu 5-phyllus. *Bacca* multi-locularis, truncata.
- Alba.* N. Fol. cordatis, integerrimis, calyce 4-fido. L. T. *Le nymphea ou nénuphar.*
V. rafraîchissante, adoucissante.

185. **TILIA.** *Cor.* 5-petala, *cal.* 5-partitus. *Bacca* ficca globosa, 5-ocularis, 5-valvis, basi dehiscens.
- Europæa.* T. Floribus nectario destitutis. L. *Tilia* fœmina. T. *Le tilleul.*
V. céphalique, anti-histérique, anti-épileptique.
186. **CISTUS.** *Cor.* 5-petala. *Cal.* 5-phyllus: foliolis duobus minoribus. *Capsula.*
- Laurifolius.* C. Arborescens extipulatus, foliis oblongo-ovatis petiolatis, trinerviis, supra glabris: petiolis basi connatis. L. *Cistus* ledon foliis laurinis. T.
V. vulnéraire.
- Ladaniferus.* C. Arborescens extipulatus, fol. lanceolatis supra lævibus, petiolis basi coalitis vaginantibus. L. T. *Le ciste.*
V. astringente, résolutive, balsamique.
- Salvifolius.* C. Arborescens extipulatus, fol. ovatis petiolatis utrinque hirsutis. L. *Cistus* fœmina salviæfolio elatior. T.
V. astringente.
- Helianthemum.* C. Subfruticosus, procumbens, stip. lanceolatis. Foliis oblongis revolutis subpilosiss. L. *Helianthemum* vulgare flore luteo. T.
V. astringente, vulnéraire.

Digynia.

187. **PÆONIA.** *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. styli 0. *caps.* polyspermæ.
- Officinalis.* P. Foliolis oblongis. L. *Pæonia* mas & fœmina. T. *La pivoine mâle.*
V. céphalique, anti-spasmodique.

Trigynia.

188. **DELPHINIUM.** *Cal.* 0. *petala* 5. *nectarium* 2-fidum,

- postice cornutum. *Siliquæ* 3. f. 1.
- Consolida.* D. Nectariis 1-phyllis, caule subdiviso. L. Delphinium segetum. T. V. astringente, vulnéraire.
- Ajacis.* D. Nectariis monophyllis, caule simplici. L. Delph. hortense flore majore & simplici. T. V. vulnéraire, consolidante.
- Staphisagria.* D. Nectariis tetraphyllis petalo brevioribus, fol. palmatis lobis obtusis. L. Delphinium platanifolio. T. *Le staphisaigre* ou *l'herbe aux yeux*. V. purgatif violent.
189. ACONITUM. *Cal.* 0. *petala* 5, supremo fornicato. — *Nectaria* 2, pedunculata, recurva siliquæ 3 seu 5.
- Lycotkonum.* A. Fol. palmatis, multifidis, villosis. L. T. *Le tue-loup*. V. poison violent.
- Napellus.* A. Foliorum laciniis linearibus superne latioribus, linea exaratis. L. Aconitum cæruleum seu napellus. T. *Le napel*. V. fébrifuge, anti-schirreuse.
- Anthora.* A. Flor. pentagynis, foliorum laciniis linearibus. L. Aconitum salutariferum seu anthora. T. *L'antithora*. V. alexitère.

Pentagynia.

190. AQUILEGIA. *Cal.* 0. *petala* 5. *nectaria* 5. corniculata interpetala. *caps.* 5. distinctæ.
- Vulgaris.* A. Nectariis incurvis. L. Aquilegia sylvestris. T. *L'ancolie* ou *églantine*. V. apéritive, sudorifique.
- 191 NIGELLA. *Cal.* 0. *petala* 5. *nectaria* 5, trifida, intra corollam. *Capsulæ* 5. connexæ.
- Sativa.* N. Pistillis 5. capsulis muricatis subrotundis,

foliis subpilosis. L. Nigella flore minore
simplici candido. T. *la nielle.*

- Arvensis.* N. Pistillis quinis, pet. integris capf. turbinatis. L. Nigella arvensis cornuta. T. *La toute épice.*
V. ces deux especes sont incisives & apéritives.

Polygynia.

192. ANEMONE. *Cal.* o. pet. 6. 9. *sem.* plura.
Hepatica. A. Foliis trilobis integerrimis. L. Ranunculus tridentatus vernus flore. T. *L'hépatique.*
V. vulnéraire, astringente.
Pulsatilla. A. Pedunculo involucrato, pet. rectis, fol. bipinnatis. L. Pulsatilla folio crassiori, majori flore. T. *La pulsatille.*
V. détersive & résolutive.
193. CLEMATIS. *Cal.* o. *petala* 4. rarius 5-vel 6. *sem.* caudata.
Flammula. C. Foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis. L. Clematis five flammula. T. *L'herbe aux gueux.*
V. incisive, résolutive.
194. THALICTRUM. *Cal.* o. *petala* 4. f. 5. *sem.* ecaudata.
Flayum. T. Caule folioso fulcato, panic. multiplici erecta. L. Talictrum majus filiqua angulosa seu striata. T. *Le thalictrum.*
V. vulnéraire, apéritive, astringente.
195. ADONIS. *Cal.* 5-phillus. *Petala* quinis plura absque nectario. *Sem.* nuda.
Vernalis. A. Flore dodecapetalo: fructu ovato. L. Ranunculus fœniculaceis foliis hellebori radice. T. *L'hellebora d'Hippocrate.*
V. purgative, ydragogue.
196. RANUNCULUS. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5. intra

- ungues poro mellifero. *Sem.* nuda.
- Ficaria.* R. Fol. cordatis angulatis petiolatis, caule unifloro. L. *Ranunculus vernus rotundifolius major & minor.* T. *La petite chelidoine.*
V. rafraîchissante & résolutive.
- Sceleratus.* R. Fol. inferioribus palmatis : summis digitatis, fructibus oblongis. L. *Ranunculus palustris apii folio lævis.* T.
V. poison violent.
197. HELLEBORUS. *Cal. o. pet. 5. f. plura. Nectaria bilabiata, tubulata. Caps. polyspermæ, erectiusculæ.*
- Niger.* H. Scapo subbifloro subnudo, fol. pedatis. L. T. *L'hellebore noir ou feu.*
V. purgative.
- Fætidus.* H. Caule multifloro folioso, fol. pedatis. L. *Helleborus niger fætidus.* T. *Le pied de griphon.*
V. purgatif violent.

CLASSIS XIV^a. DIDINAMIA.

Gymnospermia.

198. AJUGA. *Corollæ labium superius minimum, stamina labio superiore longiora.*
- Reptans.* A. Glabra, stolonibus reptantibus. L. *Bugula.* T. *La bugle.*
V. astringente, vulnéraire.
199. TEUCRIUM. *Cor. labium superius (nullum) ultra basim bipartitum, divaricatum ubi stamina.*
- Scorodonia.* T. Fol. cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto. L. *chamædris fruticosa sylvestris melissæ folio.* T. *La sauge sauvage.*

V.

- V. apéritive , diurétique.
- Polium.** T. Spicis subrotundis , fol. oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus. Caule prostrato. L. *Polium montanum*. T. *Le polium*.
V. apéritive , alexitère.
- Chamæpitis.** T. Fol. trifidis linearibus integerrimis, flor. sessilibus lateralibus solitariis caule diffuso. L. *Chamædris lutea vulgaris folio trifido*. T. *Le chamæpitis*.
- Iva.** T. Fol. subtricuspidatis linearibus , flor. sessilibus lateralibus solitariis. L. *Chamæpitis moscata folio serrato*. T. *L'ivete*.
V. ces deux especes sont apéritives , céphaliques & emménagogues.
- Marum.** T. Fol. integerrimis ovatis , acutis petiolatis subtus tomentosis , flor. racemosis secundis. L. *Chamædris maritima , incana , frutescens foliis lanceolatis*. T. *Le marum*.
V. céphalique , cordiale , sternutatoire.
- Scordium.** T. Fol. oblongis sessilibus dentato-ferratis floribus geminis axillaribus pedunculatis , caule diffuso. L. *Chamædris palustris canescens sive scordium officinarum*. T. *Le scordium ou germandrée aquatique*.
V. apéritive , stomachique.
- Chamædris.** T. Fol. cuneiformi-ovatis incisifs crenatis petiolatis , flor. ternis , caulibus procumbentibus subpilosis. L. *Chamædris major*. T. *Le petit chéne*.
V. apéritive , sudorifique , fébrifuge.
200. SATUREJA. Cor. lacinia subæquales. Stamina distantia.
- Hortensis.** S. Pedunculis bifloris. L. T. *La sariete*.
V. apéritive , incisive , fortifiante.
201. HYSSOPUS. Cor. labium inf. lacinula intermedia crenata. Stam. recta , distantia.
- Officinalis.** H. Spicis secundis , foliis lanceolatis. L.

- Hyssopus officinarum cærulea. T.
Lyffope.
 V. stomachique, détersive.
202. NEPETA. *Cor.* labium inf. lacinula intermedia
 crænata : faux margine reflexo. *Stam.*
 approximata.
- Cataria.* N. Floribus spicatis : verticillis subpedicel-
 latis, foliis petiolatis cordatis dentato
 ferratis. L. *Cataria major & vulgaris.* T.
L'herbe aux chats.
 V. apéritive, emménagogue.
203. LAVANDULA. *Cal.* ovatus subdentatus, bractea
 suffultus. *Cor.* resupinata. *Stam.* intra
 tubum.
- Stæchas.* L. Fol. sessilibus, linearibus, margine re-
 volutis, spica coarctata comosa. L. *Stæ-*
chas purpurea. T. *Le stechas.*
 V. céphalique, nervine.
- Spica.* L. Fol. sessilibus, lanceolato-linearibus
 margine revolutis, spica interrupta nu-
 da. L. *Lavendula latifolia & angustifo-*
lia. T. *La lavande.*
 V. cordiale, céphalique, emménago-
 gue.
204. MENTHA. *Cor.* subequalis quadrifida lacinia latiore
 emarginata. *Stam.* erecta distantia.
- Aquatica.* M. Floribus spicatis, fol. ovatis ferratis
 petiolatis, staminibus corolla longiori-
 bus. L. *Mentha rotundifolia palustris*
five aquatica major. T. *Le baume d'eau.*
 V. stomachique, diurétique.
- Gentilis.* M. Flor. verticillatis, fol. ovatis acutis. Ser-
 ratis. *Stam.* corolla brevioribus. L.
Mentha sylvestris verticillata ocymi odo-
re. T. *Le baume de jardin.*
 V. anti-hystérique, stomachique.
- Pulegium.* M. Flor. verticillatis, fol. ovatis obtusis
 subcrenatis, caulibus subteretibus re-
 pentibus, *stam.* corolla longioribus. L.

Mentha aquatica sive *pulegium*. T. *Le pouliot*.

V. incisive, apéritive, emménagogue.

205. GLECHOMA. *Antherarum* singulum par in formam crucis connivens. Calyx 5-fidus.

Hederacea. G. Fol. reniformibus crenatis. L. *Calamintha humilior* folio rotundiore. T. *Le liere terrestre*.

V. apéritive, détersive, vulnéraire.

206. LAMIUM. *Corollæ* lab. sup. integrum fornicatum; lab. inf. bilobum, faux utrinque margine dentata.

Album. L. Fol. cordatis acuminatis ferratis petiolatis, verticillis vigintifloris. L. *Lamium album* sive *archangelica* flore albo. T. *L'archangélique*.

V. béchique, lithontriptique, astringente.

207. GALEOPSIS. *Corollæ* lab. super. subcrenatum fornicatum, lab. inf. supra 2-dentatum.

Galeobdolon. G. Verticillis 6-floris : involucre 4-phillo. L. *Galeopsis* sive *urtica iners* flore luteo. T.

V. diurétique, apéritive, astringente.

208. BETONICA. *Cal.* aristatus, *cor.* lab. super. adscendens, planiusculum, tubus cylindricus.

Officinalis. B. Spica interrupta. *Cor.* labii lacinia intermedia emarginata. L. *Betonica purpurea*. T. *La betoine*.

V. céphalique, tonique, sternutatoire.

209. STACHYS. *Cor.* lab. super. fornicatum, lab. infer. lateralibus reflexum : lacinia intermedia majore emarginata. *Stamina* deflorata versus latera reflexa.

Palustris. S. Verticillis sub-sexfloris, fol. linearilanceolatis semi amplexicaulibus, sessilibus. L. *Galeopsis palustris betonicæ* folio flore variegato. T.

V. vulnéraire, astringente.

Germanica. S. Verticillis multifloris, foliorum serraturis imbricatis, caule lauato. L. *Stachys*

- major germanica. T. *L'épi fleuri*.
V. anti-épileptique, anti-hystérique.
210. BALLOTA. *Cal.* hypocrateriformis, 5-dentatus, 10-striatus, *cor.* lab. super. crenatum, concavum.
- Nigra.* B. Foliis cordatis indivisis ferratis, calycibus acuminatis. L. Marrubium nigrum. T. *Le marrube noir*.
V. anti-hystérique.
211. MARRUBIUM. *Cal.* hypocrateriformis, rigidus, 10-striatus. *Corollæ* lab. sup. 2-fidum, lineare, rectum.
- Vulgare.* M. Dentibus calycinis setaceis uncinatis. L. Marrubium album vulgare. T. *Le marrube blanc*.
V. apéritive, emménagogue.
212. LEONURUS. *Antheræ* punctis nitidis adspersæ.
- Cardiaca.* L. Fol. caul. lanceolatis 3-lobis. L. Cardiacca. T. *L'agripaume*.
V. anti-hystérique.
213. MOLUCCELLA. *Cal.* campanulatus, ampliatus, *corolla* latior, spinosus.
- Lævis.* M. Calicibus campanulatis sub. 5-dentatis: denticulis æqualibus. L. T. *La melisse des isles molluques*.
- Spinosa.* M. Calycibus ringentibus, 8-dentatis. L. T. V. ces deux especes sont alexitères, céphaliques.
214. CLINOPODIUM. *Involucr.* multifetum, verticillo subjectum.
- Vulgare.* C. Capitulis subrotundis, hispidis, bracteis setaceis. L. Clinopodium origano simile elatius majore flore. T. *Le basilic sauvage*.
215. ORIGANUM. *Strobilus* 4-gonus, spicatus, calyces colligens.
- Dictamnus.* O. Foliis inferioribus tomentosus, spicis nutantibus. L. Origanum creticum tomentosum seu dictamnus creticus. T.

Le dictame de crête.

Vulgare. O. Spicis subrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ovatis. L. *Origanum sylvestre* five *cunila bulbula*. T. *L'origan*.

V. diurétique, stomachique.

Majorana. O. Fol. ovatis obtusis. Spicis subrotundis compactis pubescentibus. L. *Majorana vulgaris*. T. *La marjolaine*.

V. résolutive, nerveine, céphalique.

216. THYMUS. *Calycis bilabiatis faux villis clausa.*

Serpillum. T. Floribus capitatis caulibus repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis. L. *Serpillum vulgare*. T. *Le serpolet*.

V. céphalique, emménagogue.

Vulgaris. T. Erectus fol. revolutis ovatis, flor. verticillato-spicatis. L. T. *Le thym*.

V. incisive, céphalique.

Acinos. T. Flor. verticillatis, pedunculis 1-floris, caul. erectis subramosis, fol. acutis serratis. L. *Clinopodium arvense ocymi facie*. T. *Petit basilic sauvage*.

V. astringente, résolutive.

217. MELISSA. *Calix aridus, supra planiusculus: lab. superiore subfastigiato. Cor. lab. super. subforficatum, 2-fidum; lab. inf. lobo medio cordato.*

Officinalis. M. Racemis axillaribus verticillatis: pedicellis simplicibus. L. *Melissa hortensis*. T. *La melisse*.

Calamintha. M. Pedunc. axillaribus dichotomis longitudine foliorum. L. *Calamintha vulgaris officinarum germaniæ*. T. *Le calament*. V. incisive, emménagogue.

Nepeta. M. Pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus caule ascendente hirsuto. L. *Calamintha pulegii odore* five *nepeta*. T.

- V. anti-hystérique , apéritive.
218. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflata : labium superius concavum.
Moldavica. D. Flor. verticillatis , bracteis lanceolatis : ferraturis capillaceis. L. *Moldavica betonica* folio flore cæruleo. T. *La melisse des moldaves.*
 V. cordiale , stomachique.
219. MELITTIS. *Cal.* tubo corollæ amplior. *Corollæ* lab. sup. planum , lab. infer. crenatum. *Antheræ* cruciatæ.
Melissophyllum. Melittis. L. *Melissa humilis latifolia* , flore maximo purpurascens. T. *La melisse de montagne.*
 V. vulnéraire , diurétique.
220. OCYMUM. *Cal.* lab. superiore orbiculato , inferiore 4-fido. *Corollæ* resupinatæ alterum lab. 4-fidum ; alterum indivisum. *Filamenta* exteriora basi processum emittentia.
Basilicum. O. Fol. ovatis glabris , calic. ciliatis. L. *Ocimum vulgare.* T. *Le basilic.*
 V. céphalique , cordiale , nervine.
221. SCUTELLARIA. *Cal.* ore integro : post florescentiam clauso , operculato.
Galericulata. S. Fol. cordato-lanceolatis crenatis , flor. axill. L. *Cassida palustris vulgatio* flore cæruleo. T. *La toque.*
 V. fébrifuge , astringente.
222. PRUNELLA. *Filamenta* 2-furca : altero apice antherifera. *Stigma* bifidum.
Vulgaris. P. Fol. omnibus ovato oblongis , ferratis , petiolatis. L. *Brunella major* folio non dissecto. *La brunelle.*
 V. vulnéraire , astringente.
223. ANTIRRHINUM. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* basi deorsum prominens , nectarifera. *Capsula* bilocularis.
Cymbalaria. A. Fol. cordatis. 5-lobis alternis , caulibus procumbentibus. L. *Linaria hederaceo*

- folio glabro feu cymbalaria. T. *La cymbalaire*.
 V. rafraîchissante , humectante.
- Elatine.* A. Fol. hastatis alternis caulibus procumbentibus. L. *Linaria segetum nummulariæ folio aurito & villoso flore cærulæo*. T. *La velvete*.
- Spurium* A. Fol. ovatis alternis , caulibus procumbentibus. L. *Linaria segetum nummularia folio villoso*. T. *La velvete femelle*.
 V. ces deux especes sont vulnéraires , déterfives.
- Majus.* A. Corollis ecaudatis , flor. spicatis , calycibus rotundatis. L. *Anthrinum. vulgare*. T. *Le muscle de veau*.
 V. alexipharmaque.
224. SCROPHULARIA. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* subglobosa ; resupinata. *Capsf.* 2-locularis.
- Nodosa.* S. Fol. cordatis. 3-nervatis , caule obtusifungulo. L. *Scrophularia nodosa fœtida*. T. *La scrophulaire*.
 V. résolutive , émolliente.
- Aquatica.* S. Fol. cordatis obtusis petiolatis decurrentibus caule membranis angulato , racemis terminalibus. L. *Scrophularia aquatica major*. T. *La scrophulaire aquatique*.
 V. vulnéraire , carminative.
225. DIGITALIS. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata 5-fida ventricosa. *Capsf.* ovata bilocularis.
- Purpurea.* D. Calycinis foliolis ovatis-acutis , corollis obtusis , labio superiore integro. L. *Digitalis purpurea foliis asperis*. T. *La Digitale*.
 V. anti-épileptique.
226. CAPRARIA. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata ; 5-fida , acuta. *Capsf.* 2-valvis , 2-locularis , polysperma.
- Biflora.* C. Fol. alternis , flor. geminis. L. *Agera-*

- tum Americanum folio & facie rapunculi. T. *Le thé de curaço.*
 V. les mêmes que le thé ordinaire.
227. VITEX. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 6-fidus *bacca* 4-sperma.
Agnus-castus. V. Fol. digitatis ferratis, spicis verticillatis
 L. Vitex latiore folio. T. *Le poivre bâtard.*
 V. anti-hystérique.
228. ACANTHUS. *Cal.* 2-fol. 2-fidus. *Cor.* 1-labiata deflexa, 3-fida. *Capsula* 2-ocularis.
Mollis. A. Foliis finuatis inermibus. L. T. *L'acante* ou *branc-ursine.*
 V. émolliente, adoucissante.

CLASSIS XV^a. TETRADYNAMIA.

Siliculosa.

229. ANASTATICA. *Silicula* retusa, margine coronata valvulis dissepimento duplo longioribus. *Stylo* intermedio mucronato, obliquo: loculis 1-spermis.
Hierochuntica. A. Fol. obtusis, spicis axillaribus brevissimis, filiculis angulatis spinosis. L. *Thlaspi* rosa de hierico dictum. T. *La rose de jericho.*
 V. anti-scorbutique.
230. LEPIDIUM. *Silicula* emarginata, cordata, polysperma: valvulis navicularibus, marginato-carinatis.
Sativum. L. Flor. tetradynamis, fol. oblongis multifidis. L. *Nasturtium hortense.* T. *Le cresson ainois* ou *nastor.*
 V. incisive, détersive, anti-scorbutique.

Latifolium.

- Latifolium.* L. Foliis ovato-lanceolatis integris ferratis.
L. T. *La grande passerage.*
V. incisive , apéritive , diurétique , anti-
scorbutique.
- Iberis.* L. Flor. diandris tetrapetalis , fol. inferioribus lanceolatis ferratis ; superioribus linearibus integerrimis. L. *Lepidium gramineo folio seu iberis.* T. *La petite passerage.*
V. les mêmes que la précédente.
231. THLASPI. *Silicula.* emarginata , obcordata , polysperma : valvulis navicularibus marginato-carinatis.
- Arvense.* T. Siliculis orbiculatis , fol. oblongis dentatis glabris. L. *Thlaspi arvense filiquis latis.* T.
V. emménagogue , utérine.
- Campestre.* T. Siliculis subrotundis , fol. sagittatis dentatis incanis. L. *Thlaspi vulgatum.* T.
V. incisive , apéritive , détersive.
- Bursa pastoris.* T. Siliculis obcordatis , fol. radical. pinnatifidis. L. *Bursa pastoris major folio sinuato.* T. *Le tabouret ou la bourse à berger.*
V. vulnéraire , astringente , fébrifuge.
232. COCHLEARIA. *Silicula* emarginata , turgida , scabra : valvulis gibbis , obtusis.
- Officinalis.* C. Fol. radical. cordato-subrotundis , caulinis oblongis sinuatis. L. *Cochl. folio subrotundo.* T. *L'herbe aux cuilliers.*
V. anti-scorbutique.
- Coronopus.* C. Fol. pinnatifidis , caule depresso. L. *Nasturtium sylvestre capsulis cristatis.* T. *La corne de cerf.*
V. tonique , légèrement astringente , diurétique , lithontriptique.
- Armoracia.* C. Fol. radic. lanceolatis crenatis , caulinis incis. L. *Cochl. folio cubitali.* T. *Le grand raifort sauvage.*

- V. apéritive, incisive, diurétique.
233. LUNARIA. *Silicula* integra, elliptica, compresso plana, pedicellata: valvis dissepimento æqualibus, parallelis, planis. *Cal.* foliolis faccatis.
- Rediviva.* L. Fol. alternis. L. *lunaria major* siliqua oblonga. T. *la lunaire.*
V. diurétique.

Tetradinamia siliquosa.

234. DENTARIA. *Siliqua* elastice diffiliens valvulis revolutis: *stigma* emarginatum. *Cal.* longitudinaliter connivens.
- Pentaphyllos.* D. Foliis summis digitatis. L. *Dentaria heptaphyllos.* T. *la dentaire.*
V. détersive, carminative.
235. CARDAMINE. *Siliqua* elastice diffiliens valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* subhians.
- Amara.* C. Fol. pinnatis, axillis stoloniferis. L. *Cardamine flore majore, elatior.* T. *le cresson d'eau.*
V. apéritive, diurétique, anti-scorbutique, fébrifuge.
236. SISYMBRIUM. *Siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *Cal.* patens. *Corolla* patens.
- Amphibium.* S. Siliq. declinatis oblongo-ovatis, foliolis pinnatifidis ferratis. L. *Si fimbrium aquaticum* foliis in profundas laciniâs divisâs siliqua brevioris. T.
V. apéritive, détersive, diurétique.
- Sophia.* S. Petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis. L. *Si symb. annuum absinthii minoris folio.* T. *le petit thalicttrum.*
V. vulnérable, détersive, astringente.
237. ERYSIMUM. *Siliqua* columnaris, exacte tetraedra. *Cal.* clausus.

- Officinale.** E. Siliq. spicæ adpressis, foliis runcinatis. L. Erysim. vulgare. T. *Le velar* ou *zortelle*.
V. incisive, béchique, anti-scorbutique.
- Barbarea** E. Fol. liratis: extimo subrotundo. L. Syfimbrium erucæ folio glabro, flore luteo. T. *L'herbe de Ste. Barbe* ou *l'herbe au Charpentier*.
V. vulnéraire, anti-scorbutique.
- Alliaria.** E. Fol. cordatis. L. Hesperis allium redolens. T. *L'alliaire*.
V. diurétique, anti-septique.
238. **CHEIRANTHUS.** *Germen* utrinque denticulo glandulato. *Cal.* clausus: foliolis duobus basi gibbis. *Semina* plana.
- Cheiri.** C. Fol. lanceolatis acutis glabris, ramis angulatis caule fruticoso. L. leucoium luteum vulgare. T. *Le violier jaune*.
V. incisive, emménagogue.
239. **TURRITIS.** *Siliqua* longissima angulata. *Cal.* connivens erectus. *Cor.* erecta.
- Hirsuta.** T. Fol. omnibus hispida, caulinis amplicaulibus. L. Turritis minor. T. *La tourette*.
V. astringente.
240. **BRASSICA.** *Cal.* erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter stamina breviora & pistillum, interque longiora & calycem.
- Napus.** B. Radice caulescente fusi formi. L. Napus radice alba. T. *Le navet*.
- Rapa.** B. Radice caulescente orbiculari, depressa carnosa. L. Rapa sylvestris. T. *La rave*.
V. ces deux especes sont béchiques.
- Oleracea.** B. Radice caulescente tereti carnosa. L. Brassica radice alba. T. *Le chou*.
V. béchique, anti-scorbutique.
- Eruca.** B. Foliis runcinatis, caule hispido, siliquis lævibus. L. Eruca latifolia alba. T. *La roquette*.

- V. anti-scorbutique.
241. SINAPIS. *Cal. patens. Cor. ungues recti. Glandula*
inter stamina breviora & pistillum. In-
terque longiora & calycem.
- Nigra.* S. Siliquis glabris racemo appressis. L. Si-
napis rapi folio. T. *La moutarde.*
V. anti-scorbutique, fébrifuge.
242. RAPHANUS. *Cal. clausus. Siliqua torosa, subarti-*
culata, teres. Glandulæ melliferæ 2.
inter stamina breviora & pistillum, to-
tidem inter stamina longiora & caly-
cem.
- Sativus* R. Siliquis teretibus torosis bilocularibus. L.
Raphanus minor oblongus. T. *Le raifort.*
V. atténuante, diurétique.
- Raphanistrum.* R. Siliquis teretibus articulatis lævibus 1-
locularibus. L. Raphanistrum siliqua ar-
ticulata glabra majore. T. *Le raifort*
sauvage.
V. apéritive, atténuante, résolutive.
243. BUNIAS. *Silicula decidua, tetraëdra, angulis*
inæqualibus acuminatis muricata.
- Erucago.* B. Siliculis tetragonis : angulis bicristatis.
L. Erucago segetum. T. *La masse au*
bedeau.
V. incisive, atténuante.
- Cakile.* B. Siliculis ovatis lævibus ancipitibus. L.
Cakile maritima folio ampliori & angus-
tiori, fructu hastæ formi. T. *La roquette*
de mer.
V. anti-scorbutique, apéritive, diuré-
tique.
244. ISATIS. *Siliqua lanceolata, 1-locularis, 1-sper-*
ma, decidua, bivalvis : valvulis navi-
cularibus.
- Tinctoria.* I. Foliis radicalibus crenatis ; caulinis sag-
gitatis, filiculis oblongis. L. Isatis syl-
vestris. T. *Le pastel.*
V. vulnéraire, astringente, détersive.

CLASSIS XVI^a. MONADELPHIA.*Decandria.*

245. GERANIUM. Monogyna. *Stigmat* 5. *fructus* rostratus, 5-coccus.
- Robertianum* G. pedunculis bifloris, calicybus pilosis decem angulatis. L. Ger. robertianum primum. T. *L'herbe à robert.*
- Sanguineum*. G. Pedunc. 1-floris, fol. quinquepartitis trifidis orbiculatis. L. Geranium sanguineum sive hæmatodes radice crassa. T. V. ces deux especes sont astringentes.

Polyandria.

246. SIDA. *Cal.* simplex, angulatus. *Stylus* multipartitus. *Capsf.* plures 1-spermæ.
- Abutilon.* S. Fol. subrotundo-cordatis indivisis, pedunc. folio brevioribus, capsulis multilocularibus: corniculis bifidis. L. Abutilon. T. *La fausse guimauve.*
V. émolliente, diurétique, vulnéraire.
247. ALTHÆA. *Cal.* duplex: exterior 9-fidus. *Arilli* plurimi, monospermi.
- Officinalis.* A. Fol. simplicibus tomentosis. L. Althæa diofcoridis & plinii. T. *La guimauve.*
V. résolutive, émolliente.
248. ALCEA. *Cal.* duplex; exterior 3-phyllus. *Arilli* plurimi, monospermi.
- Rosea.* A. Foliis sinuato angulatis. L. Malva rosea folio subrotundo. T. *La mauve-rose ou passerose.*
V. émolliente.

249. MALVA. *Cal.* duplex : exterior 3-phyllus. *Arilli* plurimi, monospermi.

Sylvestris. M. Caule erecto herbaceo, fol. septemlobatis acutis, pedunculis petiolisque pilosis. L. Malva vulgaris flore majore folio sinuato. T. *La mauve*.
V. laxative, émolliente.

250. LAVATERA. *Cal.* duplex : exterior 3-fidus, *arilli* plurimi, monospermi.

Arborea. L. Caule arboreo, fol. septemangularibus tomentosis plicatis, pedunculis confertis unifloris axillaribus. L. Althæa arborea veneta maritima. T. *La mauve en arbre*.

V. émolliente, adoucissante.

251. GOSSYPIUM. *Cal.* duplex : exterior 3-fidus. *Capf.* 4-locularis. *Sem.* lana obvoluta.

Herbaceum. G. Fol. quinquelobis subtus eglandulosis, caule herbaceo. L. Xilon sive gossypium herbaceum. T. *Le coton*.

Pectorale, béchique, astringente.

252. HIBISCUS. *Cal.* duplex : exterior polyphyllus *capf.* 5-locularis, polysperma.

Abelmoschus. H. Fol. subpeltato-cordatis septemangularibus ferratis, caule hispido. L. Ketmia ægyptiaca semine moschato. T.

V. estimée dans les fievres pétéchiales exant. & pour la teigne.

CLASSIS XVII^a. DIADELPHIA.

Hexandria.

253. FUMARIA. *Cal.* diphyllus. *Cor.* ringens. *Filamenta* 3, membranacea, *singula antheris* 3.

Officinalis. F. *Pericarpium* monospermis racemosis,

- caule diffuso. L. *Fumaria officinarum*.
 T. *Le fumeterre*.
 V. hépatique, tonique, emménagogue.
254. POLYGALA. *Cal.* 5-phyllus : foliolis duobus alæformibus, coloratis. *Legumen* obcordatum, biloculare.
- Vulgaris.* P. Flor. cristatis racemosis, caule erecto, fol. lanceolatis. L. *Polygala major vulgaris*. T.
 V. sudorifique.

Decandria.

255. SPARTIUM. *Stigma* longitudinale, supra villosum. *Filamenta* germini adherentia. *Cal.* deorsum productus.
- Junceum.* S. Ramis oppositis teretibus apice floriferis, fol. lanceolaris. L. *Genista juncea*. T.
Le genet d'Espagne.
 V. apéritive, diurétique.
- Scoparium.* S. Foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis. L. *Cytiso-genista scoparia vulgaris* flore luteo. T. *Le genet à balais*.
 V. lithontriptique, hydragogue.
256. GENISTA. *Cal.* 2-labiatus. *Vexillum* oblongum apistillo staminibusque deorsum reflexum.
- Tinctoria.* G. Fol. lanceolatis glabris, ramis striatis teretibus erectis. L. *Genista tinctoria germanica*. T. *Le genet des Teinturiers*.
 V. apéritive, hydragogue.
257. ONONIS. *Cal.* 5-partitus : laciniis linearibus. *Vexillum* striatum. *Legumen* turgidum, sessile. *Filamenta* connata absque fissuras
- Spinosa.* O. Flor. racemosis solitariis, fol. ternatis solitariisque, ramis spinosis. L. *Ononis spinosa* flore purpureo. T. *L'arrête-bœuf*.

- V. lithontriptique.
258. ANTHYLLIS. *Cal.* ventricosus. *Legumen* subrotundum, tectum.
- Vulneraria.* A. Herbacea. Fol. pinnatis inæqualibus, capitulo duplicato. L. *Vulneraria rustica.*
T. *La vulnéraire.*
V. vulnéraire.
259. LUPINUS. *Cal.* 2-labiatus. *Antheræ* 5. oblongæ ; 5-subrotundæ. *Legumen* coriaceum.
- Varius.* L. *Cal.* femiverticillatis appendiculatis : labio superiore bifido ; inferiore subtridentato. L. *Lupinus sylvestris* purpureo flore femine rotundo vario. T. *Le lupin.*
V. émolliente , résolutive.
260. PHASEOLUS. *Carina.* cum staminibus stiloque spiritaliter tortis.
- Vulgaris.* P. Caule volubili, floribus racemosis geminis, bracteis calyce minoribus, leguminibus pendulis. L. T. *Le haricot.*
V. apéritive , émolliente , résolutive.
261. PISUM, *Stylus* triangulus, supra carinatus pubescens. *Calycis* lacinia superiores 2. breviores.
- Sativum.* P. Petiolis teretibus, stipulis inferne rotundatis crenatis, pedunculis multifloris. L. *Pisum hortense majus.* T. *Le pois.*
V. détersive , astringente , maturative.
262. OROBUS. *Stylus* linearis. *Cal.* basi obtusis : laciniis superioribus profundioribus, brevioribus.
- Vernus.* O. Fol. pinnatis ovatis, stipul. semi sagittatis integerrimis caule simplici. L. *Orobus sylvaticus purpureus vernus.* T. *L'orobe sauvage.*
V. résolutive , détersive , apéritive.
263. LATHYRUS. *Stylus* planus, supra villosus, superme latior. *Cal.* lacinia superiores 2. breviores.
- Sativus.* L. Pedunculis unifloris. Cirrhis diphyllis tetraphyllisque, legum-ovatis compressis dorso

dorso bimarginatis. L. Lathyrus sylvestris flore fructuque albo. T. *La gesse*.

V. apéritive ; laxative.

264. VICIA. Stigma latere inferiore transverse barbatur.

Sativa. V. Legum. sessilibus subbinatis erectis, foliis retusis, stip. notatis. L. Vicia sativa vulgaris. T. *La vesse*.

V. émolliente ; résolutive.

Faba. V. Caule erecto, petiol. absque cirrhis. L. Faba rotunda oblonga. T. *La fève de marais*.

V. résolutive.

265. ERVUM. *Cal.* 5-partitus, longitudine corollæ.

Lens. E. Pedunc. subbifloris, sem. compressis convexis. L. lens vulgaris. T. *La lentille*.

V. diaphorétique.

266. CICER. *Cal.* 5-partitus longitudine corollæ : laciniis quatuor superioribus vexillo incumbentibus. *Legumen* rhombeum, turgidum, dispermum.

Arietinum. C. Foliolis ferratis L. Cicer sativum. T. *Le pois chiche*.

V. résolutive.

267. COLUTEA. *Cal.* 5-fidus. *Legumen* inflatum, basi superiore dehiscens.

Arborescens. C. Arborea, foliolis obcordatis. L. Collutea vesicaria. T. *Le baguenaudier*.

V. purgative.

268. GLYCIRRHIZA. *Cal.* 2-labiatus. *Legumen* ovatum, compressum.

Glabra. G. Legum. glabris, stipul. nullis, foliol. impari petiolato. L. Glycyrrhiza glabra & germanica radice repente. T. *Le réglisse*.

V. édulcorante ; expectorante.

269. CORONILLA. *Cal.* 2-labiatus ; dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum.

- Emerus.* C. fruticosa, pedunculis subtrifloris, corollarum unguibus calyce triplo longioribus, caule angulato. L. *Emerus.* T. *L'émerus.* V. laxative.
270. ORNITHOPUS. *Legumen* articulatum, teres, arcuatum.
- Scorpioïdes.* O. Fol. ternatis subsessilibus: impari maximo. L. T. *Le pied d'oiseau.* V. vulnéraire.
271. HEDYSARUM. *Cor.* carina transverse obtusa. *Legumen* articulis 1-spermis.
- Coronarium.* H. Fol. pinnatis, legum. articulatis aculeatis nudis rectis caule diffuso L. *Hedysarum clypeatum* flore suaviter rubente. T. *Le sainfoin d'Espagne.* V. incisive, apéritive, vulnéraire.
- Onobrychis.* H. Fol. pinnatis, legum. monospermis aculeatis, corollarum alis calycem æquantibus, caule elongato. L. *Onobrychis folio viciæ* fructu echinato major. T. *Le sainfoin.* V. détersive, apéritive, sudorifique.
272. INDIGOFERA. *Cal.* patens. *Corollæ* carina utrinque calcari subulato, patulo! *legumen* lineare.
- Tinctoria.* I. Foliis pinnatis obovatis, racemis brevibus caule subfructuoso. L. T. *L'indigo.* V. astringente.
273. GALEGA. *Cal.* dentibus subulatis, subæqualibus. *Legumen* striis obliquis, feminibus interjectis.
- Officinalis.* G. Leguminibus strictis erectis, foliolis lanceolatis striatis nudis. L. *Galega vulgaris.* T. V. sudorifique.
274. ASTRAGALUS. *Legumen* biloculare gibbum.
- Tragachanta.* A. Caudice arborecente, petiolis spiniscentibus. L. *Tragachanta massiliensis.* T. *L'adragan ou barbe à renard.*

- V. béchique , diurétique.
275. PSORALEA. *Calix* punctis callofis adſperſus, longi-
tudine *leguminis* 1-ſpermi.
- Bituminofa*. P. Foliis omnibus ternatis, foliolis lanceo-
latis, petiolis lævibus, flor. capitatis.
L. *Trifolium bitumen redolens*. T. *Le tréſle puant*.
V. anti-calculeuſe.
276. TRIFOLIUM. *ſtores* ſubcapitati. *Legumen* vix caly-
ce longius, non dehifcens, deciduum.
- M. Cærulea*. T. Racemis ovatis, leguminibus feminu-
dis mucronatis, caule erecto, ſpicis
oblongis. L. *melilotus major odorata*
violacea. T. *Le melilot odorant*.
V. émolliente, adouciffante.
- M. Officinalis*. T. Leguminibus racemofis nudis diſpermis
rugofis acutis, caule erecto. L. *Meli-*
lotus officinarum luteo flore & albo. T.
Le melilot.
V. apéritive, réſolutive, anodine.
- Pratenſe*. T. Spicis globofis ſubvilloſis cinctis ſtipulis
oppositis membranaceis, corollis mo-
nopetalis. L. *Trifolium pratense flore*
monopetalo. T. *Le tréſle des prés*.
V. déterſive, adouciffante, rafraîchiſ-
fante.
277. LOTUS. *Legumen* cylindricum, ſtrictum. *Alæ*
ſurſum longitudinaliter conniventes. *Ca-*
lix tubuloſus.
- Hirſutus*. L. Capitulis ſubrotundis, caule erecto hir-
to, legum. ovatis. L. *Lotus hæmorrhoi-*
dalis. T. *Le lottier hémorrhoidal*.
V. anti hémorrhoidal.
- Dorycnium*. L. Capitulis aphyllis, foliis ſeſſilibus qui-
natis. L. *Dorycnium Monſpeliensium*. T.
V. déterſive, aſtringente.
278. TRIGONELLA. *Vexillum* & *alæ* ſubæquales, pa-
rentes, forma corollæ tripetalæ.
- Fænum græcum*. T. Legum. ſeſſilibus ſtrictis, erectiufcu-

lis ; subfalcatis acuminateis , caule erecto. L. Fœnum græcum sylvestre. T. *Le fœnu-grec.*

V. émolliente , détersive , résolutive.

279. MEDICAGO. *Legumen compressum , cochleatum , carina corollæ à vexillo deflectens.*

Sativa. M. Pedunc. racemosis , legum. contortis , caule erecto glabro. L. Medicago major erectior floribus purpureis. T. *La luzerne.*

V. diurétique , adoucissante.

CLASSIS XVIII^a. POLYADELPHIA.

Icosandria.

280. CITRUS. *Cal. 5-fidus , petala 5 , oblonga antheræ 20-filamentis connatis in varia corpora. Bacca 9-ocularis.*

Medica. C. petiolis linearibus. L. Citrum vulgare. T. *Le citronnier ou limonier.*
V. anti scorbutique , diurétique , antiseptique , rafraichissante.

Aurantium. C. Petiolis alatis , fol. acuminateis. L. Aurantium acrimedula. T. *L'oranger.*
V. rafraichissante , tempérante.

Polyandria.

281. HYPERICUM. *Cal. 5-partitus. Petala 5. filamenta multa , in 5-phalanges basi connata.*

Androsæmum. H. Flor. trigynis , frut. baccatis , caule fruticoso ancipiti. L. Androsæmum maximum frutescens. T. *La toute saine.*
V. apéritive , vulnéraire , résolutive.

Perforatum. H. Floribus trigynis , caule ancipiti , foliis obtusis pellucido-punctatis. L. *Hypericum vulgare*. T. *Le mille pertuis*.
V. vulnéraire , diurétique , anti-hystérique.

CLASSIS XIX^a. SYNGENESIA.

Polygamia æqualis.

282. TRAGOPOGON. *Recept. nudum*, *Cal. simplex pappus plumosus*.
Pratense. T. Calyc. corollæ radius æquantibus , foliis integris strictis. L. T. *La barbe de bouc*.
V. apéritive.
- Porrifolium*. T. Calic. corollæ radio longioribus , foliis integris , strictis pedunculis superne incrassatis , corollulis angustissimis truncatis. L. *Tragopogon purpureo cæruleum porrifolio vulgo*. T. *Le falsifix*.
V. béchique , stomachique , apéritive.
283. SCORZONERA. *Receptaculum nudum*. Pappus plumosus. *Cal. imbricatus squamis margine scariosis*.
Hispanica. S. Caule ramoso , foliis amplexicaulibus integris ferrulatis. L. *Scorzonera latifolia sinuata*. T.
V. diurétique , apéritive , sudorifique.
284. SONCHUS. *Recept. nudum*. *Cal. imbricatus , ventricosus. Pappus pilosus*.
Oleraceus. S. Pedunc. tomentosus , calycibus glabris. L. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*. T. *Le laiteron*.
V. humectante , rafraîchissante.
285. LACTUCA. *Recept. nudum*. *Cal. imbricatus ,*

- lindricus , margine membranaceo. *Pappus simplex* , stipitatus. *Sem.* lævia.
- Sativa.* L. Foliis rotundatis caulinis cordatis caule corymbofo. L. T. *La laitue.*
V. rafraîchissante , humectante , anodine.
- Virofa.* L. Fol. horizontalibus carina aculeatis dentatis. L. *Lactuca sylvestris* odore viroso. T.
V. apéritive , déterfive.
286. LEONTODON. *Recept.* nudum. *Cal.* imbricatus , squamis laxiusculis. *Pappus plumosus.*
- Taraxacum.* L. Calyce squamis inferne reflexis , foliis runcinatis denticulatis lævibus. L. *Dens leonis* latiore folio & roundiore. T.
Dent de lion.
V. apéritive , diurétique.
287. HIERACIUM. *Receptaculum* nudum calix imbricatus (sub inde caliculatus) ovatus. *Pappus simplex* , sessilis.
- Pilosella.* H. Fol. integerrimis ovatis subtus tomentosis , stolonibus repentibus scapo unifloro. L. *La piloselle* ou *oreille de souris.*
V. astringente , vulnéraire , vermifuge.
- Murorum.* H. Caule ramoso , fol. radicalibus ovatis dentatis caulino minori. L. *Hieracium murorum* folio pilosissimo. T. *La pulmonaire des Français.*
V. vulnéraire.
288. LAPSANA. *Recept.* nudum. *Calix* caliculatus , squamis singulis interioribus canaliculatis.
- Communis.* L. Calycibus fructus angulatis , pedunculis tenuibus ramosissimis. L. *Lapsana.* T. *L'herbe aux mamelons.*
V. rafraîchissante , émolliente , déterfive.
289. CICHORIUM. *Receptaculum* paleaceum. *Cal.* caliculatus. *Pappus* sub 5-dentatus , obsolete pilosus.
- Intybus.* C. Floribus geminis sessilibus , foliis runcinatis. L. *Cichorium sylvestre officinale.*

- narum. T. *La chicorée.*
V. apéritive, fébrifuge.
290. SCOLYMUS. *Recept.* paleaceum. *Cal.* imbricatus spinosus. *Pappus* nullus.
Hispanicus. S. Floribus congestis. L. Scolymus theophrasti. T. *L'épine jaune.*
V. apéritive.
291. ARCTIUM. *Cal.* globosus : squamis apice hamis inflexis.
Lappa. A. Foliis cordatis inermibus petiolatis. L. *Lappa major* seu arctium dioscoridis. T. *La bardane.*
V. atténuante, diurétique, sudorifique.
292. SERRATULA. *Cal.* subcylindricus, imbricatus, muticus.
Tinctoria. S. Foliis lyrato-pinnatifidis : pinna terminali maxima, flosculis conformibus. L. *Jacea* quæ ferratulæ vulgo. T.
V. vulnéraire & consolidante.
- Arvensis.* S. Foliis dentatis spinosis. L. *Cirsium arvense* fonchi folio, radice repente, flore purpurascence. T. *Le chardon hémorrhoïdal.*
V. apéritive.
293. CARDUUS. *Cal.* ovatus, imbricatus squamis spinosis. *Recept.* pilosum.
Marianus. C. Fol. amplexicaulibus hastato-pinnatifidis spinosis, calyc. aphyllis : spinis canaliculatis duplicato spinosis. L. *Carduus albus* maculis notatus. T. *Le chardon-marie.*
V. Thorachique, sudorifique, diurétique.
294. ONOPORDUM. *Recept.* favosum. *Cal.* squamæ mucronatæ.
Acanthium. O. Calycibus squarrosis, squamis patentibus, fol. ovato-oblongis sinuatis. L. *Carduus tomentosus* acanthi folio vulgaris. T. *Le pet d'âne* ou *l'épine blanche.*

- V. apéritive , carminative.
295. CYNARA. *Cal.* dilatatus , imbricatus squamis car-
nosis , emarginatis cum acumine.
- Scolymus.* C. Foliis subspinosis pinnatis indivisisque ,
calycinis squamis ovatis. L. *Cynara syl-*
vestris latifolia. T. *L'artichaut.*
- Cardunculus.* C. Foliis spinosis : omnibus pinnatifidis , ca-
lycinis squamis ovatis. L. *Cynara spino-*
sa , cujus pediculi esitantur. T. *Le carde.*
V. ces deux espèces sont diurétiques.
296. CARLINA. *Cal.* radiatus squamis marginalibus
longis , coloratis.
- Acaulis.* C. Caule unifloro flore brevior. L. *Carli-*
na acaulos magno flore albo. T. *La*
carline.
V. sudorifique , alexipharmaque.
297. CARTHAMUS. *Cal.* ovatus , imbricatus squamis
apice subovato foliaceis.
- Tinctorius.* C. Fol. ovatis integris ferrato aculeatis. L.
Cnicus sativus seu carthamus officina-
rum. T. *Le safran bâtard.*
V. purgative , diurétique.
- Lanatus.* C. Caule piloso , superne lanato , foliis
inferioribus pinnatifidis : summis ample-
xicaulibus dentatis. L. *Cnicus attractilis*
lutea dictus. T. *Le chardon béni des*
parisiens.
V. alexitere , apéritive , sudorifique.
298. CACALIA. *Recept.* nudum. *Pappus pilosus cal.* cy-
lindricus , oblongus , basi tantum subca-
lyculatus.
- Alpina.* C. Fol. reniformi-cordatis acutis denticu-
latis. L. *Cacalia foliis cutaneis acutiori-*
bus & glabris ; crassis & hirsutis. T.
V. émolliente & adoucissante.
299. EUPATORIUM. *Recept.* nudum. *Pappus plumosus.*
Cal. imbricatus , oblongus. *Stylus semi-*
bifidus , longus.
- Cannabinum.* E. Foliis digitatis. L. T. *L'eupatoire.*

- V. vulnéraire , hépatique , diurétique.
 300. SANTOLINA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus.
Cal. imbricatus , hemisphæricus.
Chamæ cyparissus S. Pedunc. unifloris , foliis quadrifariam dentatis. L. *Santolina* foliis teretibus. T. *La garderobe.*
 V. vermifuge , alexitère.

Polygamia superflua.

301. TANACETUM: *Recept.* nudum. *Pappus* submarginatus. *Cal.* imbricatus , hemisphericus. *Cor.* radii obsoletæ , 3-fidæ.
Vulgare. T. Fol. bipinnatis incisiferratis. L. *Tanacetum* vulgare luteum. T. *La tanaïse.*
 V. hydragogue , fébrifuge , vermifuge.
Balsamita. T. Fol. ovatis integris ferratis. L. *Tanacetum* hortense foliis & odore menthæ. T. *La menthe coq.*
 V. emménagogue , vermifuge.
 302. ARTEMISIA. *Recept.* subvillosum vel nudiusculum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus squamis rotundatis , conniventibus. *Cor.* radii nullæ.
Abrotanum. A. Fruticosa , fol. fetaceis ramosissimis. L. *Abrotanum* mas angustifolium. T. *L'aurone mâle.*
 V. incisive , diurétique.
Mariitima. A. Fol. multipartitis tomentosis racemis cernuis. flosculis fæmineis ternis. L. *Abinthium* seriphium gallicum. T. *L'absinthé de mer.*
 V. stomachique , fébrifuge , anthelmentique.
Pontica. A. Fol. multipartitis subtus tomentosis , flor. subrotundis nutantibus : *recept.* nudo. L. *Abinthium* ponticum tenui folium incanum. T. *La petite absinthe.*

- V. les mêmes que la précédente.
- Absinthium*. A. Fol. compositis multifidis, flor. subglobo-
sifis pendulis : recept. villoso. L. *Absinthium ponticum seu romanum. La grande absinthe.*
V. stomachique, fébrifuge, emménagogue.
- Vulgaris*. A. Fol. pinnatifidis planis incisifis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, flor. radio 5-floro. L. T. *L'armoise.*
V. anti-hystérique, fébrifuge.
- Dracunculus*. A. Fol. lanceolatis glabris integerrimis. L. *Abrotanum linifolio aciori & odorato.*
T. *L'estragon.*
V. stomachique, diurétique, incisive.
303. GNAPHALIUM. Recept. nudum. *Pappus plumosus.*
Cal. imbricatus : squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis.
- Dioicum*. G. Sarmentis procumbentibus, caule simplicissimo, corymbo simplici, flor. divisifis. L. *Gnaphalium montanum flore rotundiore.* T. *Le pied-de-chat.*
V. béchique, incrassante.
- Stœchas*. G. Fruticosum, fol. linearibus, corymbo composito, ramis virgatis. L. *Elichrysum seu stœchas citrina angustifolia.* T. *Lim-mortelle sauvage.*
V. anthelmentique, emménagogue, apéritive.
304. CONIZA. Recept. nudum. *Pappus simplex.* *Cal. imbricatus, subrotundus. Cor. radii trifidæ.*
- Squarrosa*. C. Fol. lanceolatis acutis, caule herbaceo corymboso, calycibus squarrosis. L. *Coniza major vulgaris.* T. *La conize.*
V. diurétique, emménagogue.
305. TUSSILAGO. *Receptaculum nudum. Pappus simplex.* *Cal. squammæ æquales, discum æquantes, sub membranaceæ.*

- Farfara.* T. Scapo unifloro imbricato, fol. subcordatis angulatis denticulatis. L. *Tussilago vulgaris.* T. *Le tussilage* ou *pied-d'âne.*
V. béchique, expectorante.
306. **SENECIO.** *Receptaculum nudum. Pappus simplex.*
Cal. cylindricus caliculatus: squammis apice sphaclatis.
- Vulgaris.* S. Corollis nudis, fol. pinnato sinuatis amplexicaulibus. Flor. sparsis. L. T. *Le seneçon.*
V. émolliente.
- Jacobæa.* S. Corollis radiantibus, fol. pinnato-lyratis; laciniis lacinulatis, caule erecto. L. *Jacobæa vulgaris laciniata.* T. *La jacobée.*
V. détersive, émolliente, vulnéraire.
307. **SOLIDAGO.** *Receptaculum nudum. Pappus simplex.*
Cor. radii circiter 5. Cal. squamæ imbricatæ, clausæ.
- Virgaurea.* S. Caule flexuoso angulato, racemis paniculatis erectis, confertis. L. *Virgaurea latifolia vulgaris.* T. *La verge d'or.*
V. détersive, apéritive, diurétique.
308. **INULA.** *Recept. nudum. Pappus simplex. Antheræ basi in setas duas desinentes.*
- Helenium.* I. Fol. amplexicaulibus ovatis rugosis subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. L. *Aster omnium maximus.* T. *L'aunée.*
V. stomachique, diurétique, apéritive, béchique.
- Crithmifolia.* I. Fol. linearibus carnosis tricuspидatis. L. *Aster maritimus folio tereti crasso tridentato.* T.
V. désobstruante.
309. **DORONICUM.** *Recept. nudum. Pappus simplex.*
Calycis squammæ duplicis ordinis æquales, disco longiores. Sem. radii nuda pappoque destituta.
- Pardalianches.* D. Foliis cordatis obtusis denticulatis; ra-

- dicalibus petiolatis; caulinis amplexicaulibus. L. *Doronicum maximum* folio caulem amplexante. T. *Le doronic*.
V. céphalique.
310. ARNICA. *Receptaculum nudum. Pappus simplex. Corollulæ radii filamentis 5, absque antheris.*
- Montana.* A. Foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis. L. *Doronicum plantaginis* folio. T. *La bétaine de montagne*.
V. vulnéraire, apéritive, vomitive, fébrifuge.
311. BELLIS. *Recept. nudum conicum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus: squamis æqualibus. Sem. obovata.*
- Peremis.* B. Scapo nudo. L. *Bellis fylvestris minor*. T. *La paquerette*.
V. vulnéraire, résolutive.
312. CHRYSANTHEMUM. *Recept. nudum. Pappus marginatus. Cal. hemisphæricus, imbricatus squamis marginalibus membranaceis.*
- Leucanthemum.* C. Fol. amplexicaulibus oblongis superne ferratis; inferne dentatis. L. *Leucanthemum vulgare*. T. *Laquette*.
V. vulnéraire, détersive, atténuante.
313. MATRICARIA. *Recept. nudum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus, imbricatus: marginalibus solidis, acutiusculis.*
- Parthenium.* M. Fol. compositis planis: foliolis ovatis incisis pedunculis ramosis. L. *Matricaria vulgaris* seu *fativa*. T. *La matricaire*.
V. hystérique, emménagogue.
314. ANTHEMIS. *Receptac. paleaceum. Pappus nullus. Cal. hemisphæricus subæqualis. Flosculi radii plures quam 5.*
- Nobilis.* A. Fol. bipinnatis-compositis linearibus acutis subvillosis. L. *Chamæmelum nobile* seu *leucanthemum odorarius*. T. *La camomille des boutiques*.

- V. carminative , anodine , fébrifuge.
315. ACHILLEA. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* ovatus , imbricatus. *Flosculi* radii circiter 4.
- Ageratum.* A. Fol. lanceolatis obtusis acute ferratis. L. *Ptermica lutea* suave olens. T. *L'eupatoire de mézué.*
V. anthelmenthique.
- Millefolium.* A. Fol. bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis , caul. superne sulcatis. L. *Millefolium vulgare.* T. *Le mille-feuille.*
V. vulnéraire , astringente , tonique.

Polygamia frustranea.

316. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum planum. *Pappus* 2-phyllus. *Cal.* imbricatus , subquarrosus.
- Annuus.* H. Fol. omnibus cordatis trinervatis , pedunc. incrassatis , floribus cernuis. L. *Coronafolis maxima.* T. *Le tournesol de jardin.*
V. vulnéraire.
- Tuberosus.* H. Fol. ovato-cordatis tripli nerviis. L. *Corona solis parvo flore* , tuberosa radice. T. *Le topinambour.*
V. détersive , astringente.
317. CENTAUREA. *Recept.* fetosum. *Pappus* simplex, *Cor.* radii infundibuliformes , longiores , irregulares.
- Cyanus.* C. Calyc. ferratis , fol. linearibus integerrimis : infimis dentatis. L. *Cyanus segetum.* T. *Le bluët.*
V. ophtalmique.
- Benedicta.* C. Calyc. duplicato-spinosis lanatis involucreatis , fol. semi decurrentibus denticulato-spinosis. L. *Carduus benedictus.* T. *Le chardon-bénit.*

V. sudorifique.

- Calcitrapa. C.** Calyc. subduplicato spinosis sessilibus, fol. pinnatifidis linearibus dentatis, caule piloso. L. *Carduus stellatus* sive *calcitrapa*. T. *La chauffe trape*.
V. diurétique, fébrifuge.

Polyg. necessaria.

318. **GALENDULA.** *Receptaculum nudum. Pappus nullus. Cal. polyphyllus. Æqualis. Sem. dif-
fici membranacea.*

Officinalis. C. Sem. cimbiformibus muricatis incurvatis omnibus. L. *Caltha arvensis*. T. *Le fouci*.

V. apéritive, résolutive, emménagogue.

319. **FILAGO.** *Recept. nudum. Pappus nullus Cal. im-
bricatus. Flosculi fœminei inter squamas
calycis locati.*

Germanica. F. Panicula dichotoma, flor. rotundatis axillaribus hirsutis, fol. acutis. L. *Filago impia dodonei*. T. *L'herbe à coton*.

V. vulnéraire, astringente.

Monogamia.

320. **LOBELIA.** *Cal. 5-fidus. Corolla 1-petala, irregula-
ris. capsula infera 2-f. 3-locularis.*

Siphilitica. L. Caule erecto, fol. ovato-lanceolatis subferratis, calycum sinibus reflexis. L. V. anti-vénérienne.

321. **VIOLA.** *Cal. 5-phyllus. Cor. 5-petala irregularis
postice cornuta, capsula supera trival-
vis. 1-loculatis.*

Odorata. V. Acaulis, fol. cordatis, stolonibus rep-
tantibus. L. *Viola martia purpurea flore
simplici*. T. *La violette*.

- Tricolor*, V. V. émolliente , laxative , béchique.
 V. Caule triquetro diffuso fol. oblongis incisifis , stipul. pinnatifidis. L. *Viola arvensis tricolor*. T. *La pensée*.
 V. détersive , incisive , vulnéraire.

 CLASSIS XX^a. GYNANDRIA.

Diandria.

322. ORCHIS. *Nectarium* corniforme pone florem.
Mascula. O. Bulbis indivisis , nectarii labio 4-lobo crenulato : cornu obtuso , petalis dorsalibus reflexis. L. *Orchis morio mas*. T. *Le salep*.
 V. analeptique , aphrodisiaque.
323. OPHRYS. *Nectarium* subtus subcarinatum.
Ovata. O. Bulbo fibroso caule bifolio : fol. ovatis , nectarii labio bifido. L. *Ophrys bifolia*. T. *La double-feuille*.
 V. vulnéraire , détersive.
324. SERAPIAS. *Nectarium* ovatum , gibbum , labio ovato.
Latifolia. S. Bulbis fibrosis , fol. ovatis amplexicaulis , flor. pendulis. L. *Helleborine latifolia montana*. T.
 V. détersive , vulnéraire.

Hexandria.

325. ARISTOLOCHIA. Hexagina. *Cal.* o. corolla 1-
 petala , lingulata , integra. *Capsula* 6-
 locularis , infera.
Pistolochia. A. Fol. cordatis crenulatis subtus reticulatis petiolatis , flor. solitariis. L. *Aristolochia*

- pistolochia dicta. T. *La pistoloche*.
V. apéritive , diurétique.
- Rotunda.** A. Fol. cordatis subsessilibus , obtusis , caule infirmo , flor. solitariis. L. T. *L'aristoloche ronde*.
V. résolutive , emménagogue , détersive.
- Longa.** A. Fol. cordatis petiolatis integerrimis obtusiusculis , caule infirmo , flor. solitariis. L. T. *L'aristoloche longue*.
V. les mêmes que la précédente.

Dodecandria.

326. **CYTINUS.** Monogyna. *Cal.* 4 fidus , superus. *Cor.* o. *antheæ* 16. sessiles. Bacca 8-locularis , polysperma.
- Hypocistis.** *Cytinus.* L. *Hypocistis.* T. *L'hypociste*.
V. astringente.

Polyandria.

327. **ARUM.** *Spatha* 1-phylla , cucullata. *Spadix* supra nudus , inferne fœmineus medio stamineus.
- Dracunculus.** A. Fol. pedatis : foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem. L. *Dracunculus polyphyllus.* T. *La serpenteaire*.
V. incisive.
- Maculatum.** A. Acaule , fol. hastatis integerrimis , spadice clavato. L. *Arum vulgare.* T. *Le pied-de-veau*.
V. incisive , apéritive.

 CLASSIS XXI^a. MONOECIA.
Diandria.

328. **LEMNA.** MASC. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla.

FEM.

FÆM. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* nulla. *Stilus.*
1. *caps.* 1-ocularis.

- Minor.* L. Fol. sessilibus utrinque planiusculis radi-
cibus solitariis. L. Lenticula palustris.
T. *La lentille d'eau.*
V. rafraîchissante.

Triandria.

329. ZEA. MASC. indistinctis spicis. *Cal.* gluma bi-
flora, mutica. *Cor.* gluma mutica.
FÆM. *Cal.* gluma bivalvis. *Cor.* gluma
bivalvis. *Stylus* 1. filiformis, pendulus.
Sem. solitaria receptaculo oblongo im-
mersa.

Mays. Zea. L. Mays granis aureis. T. *Le blé*
de Turquie.

V. diurétique, adoucissante.

330. COIX. MASC. in spicis remotis. *Cal.* gluma 2-
flora, mutica. *Cor.* gluma mutica.
FÆM. *Cal.* gluma 2-flora. *Cor.* gluma
mutica. *Stylus* bipartitus. *Sem.* calyce
ossificato tectum.

Lacrima. C. Seminibus ovatis. L. Lacrima jobi. T.
La larme de Job.

Tetrandria.

331. BETULA. MASC. *Cal.* 1-phyllus, 3-fidus, 3-flo-
rens. *Cor.* 4-partita.

FÆM. *Cal.* 1-phyllus, sub 3-fidus, 2-
florus. *Sem.* utrinque membrana alata.

Alnus. B. Pedunculis ramosis. L. *Alnus rotundi-*
folia glutinosa viridis. T. *L'aulne.*

V. résolutive, détersive.

332. BUXUS. MASC. *Cal.* 3-phyllus. *Petala* 2. *germinis*
rudimentum.

- Semper virens.* FÆM. *Cal.* 4-phyllus. *Petala* 3. *styli* 3. *caps.* 3-rostris, 3-locularis. *Sem.* 2.
Buxus. L. T. *Le buis.*
V. sudorifique, fébrifuge.
333. URTICA. MASC. *cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. nectarium centrale, cyanthiforme.
 FÆM. *cal.* 2-valvis. *Cor.* o. *sem.* 1, nitidum.
- Pilulifera.* U. *Foliis* oppositis ovatis serratis, amentis fructiferis globosis. L. *Urtica prima* Dioscoridis semine lini. T. *L'ortie romaine.*
- Urens.* U. *Fol.* oppositis ovalibus. L. *Urtica urens minor.* T. *L'ortie grièche.*
- Dioica.* U. *Fol.* oppositis cordatis, racemis geminis. L. *Urtica urens maxima.* T. *L'ortie ordinaire.*
V. ces trois especes sont diurétiques, astringentes.
334. MORUS. MASC. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o.
 FÆM. *Cal.* 4-phyllus. *Cor.* o. *styli* 2. *cal.* baccatus. *Sem.* 1.
- Alba.* M. *Fol.* oblique cordatis lævibus. L. *Morus fructu albo.* T. *Le mûrier blanc.*
V. vermifuge.
- Nigra.* M. *Fol.* cordatis scabris. L. *Morus fructu nigro.* T. *Le mûrier noir.*
V. rafraîchissante, adoucissante, expectorante.

Pentandria.

335. XANTHIUM. MASC. *Cal.* communis imbricatus. *Cor.* 1-petalæ 5-fidæ, infundibulif. *Recept.* paleaceum.
 FÆM. *Cal.* involucrium 2-phyllum, 2-florum. *Cor.* o. *drupa* sicca muricata, bifida. *Nucleus* 2-locularis.
- Strumarium.* X. *Caule* inermi, *fol.* cordatis trinervatis.

L. T. *Le glouteron*.
V. anti-écrouelleuse.

336. AMARANTHUS. MASC. Cal. 3-f. 5-phyllus. Cor. o.
stam. 3 seu 5.

FÆM. Cal. 3-f. 5-phyllus. Cor. o. styly
3. caps. 1-ocularis circumscissa. Sem. 1.

Tricolor. A. Glomerulis triandris axillaribus subro-
tundis amplexicaulibus, fol. lanceolato-
ovatis coloratis. L. *Amaranthus folio*
variegato. T. *L'amaranthe tricolor*.
V. astringente.

Blitton. A. Glomerulis lateralibus, floribus trifidis,
fol. ovatis retusis, caule diffuso. L. *Blit-*
tum sylvestre spicatum. T.
V. humectante, rafraîchissante, émol-
liente.

Polyandria.

337. POTERIUM. MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. 4-partita
stam. 30-40.

FÆM. Calix 4-phyllus. Cor. 4-partita
pist. 2. baccæ tubo corollæ indurato.

Sanguisorba. P. Inerme, caulibus subangulosis. L. *Pim-*
pinella sanguisorba minor. T. *La petite*
pimprenelle.

V. rafraîchissante.

338. QUERCUS. MASC. Cal. 5-fidus fere. Cor. o. stam.
5-10.

FÆM. Cal. 1-phyllus, integerrimus,
scaber. Cor. o. styli 2-5. sem. 1, ovatum.

Ilex. Q. Fol. ovato-oblongis indivisis ferratisque
subtus incanis, cortice integro. L. *Ilex*
folio oblongo ferrato & non ferrato. T.
Le chêne vert.

Coccifera. Q. Fol. ovatis indivisis spinoso-dentatis
utrinque glabris. L. *Ilex aculeata cocci*
glandifera. T. *Le kermes*.

- Robur.* Q. Fol. deciduis oblongis superne latioribus : sinubus acutioribus , angulis obtusis. L. Quercus latifolia mas. T. *Le chêne blanc.*
- Suber.* Q. Fol. ovato oblongis indivisis ferratis subtus tomentosis , cortice rimoso fungoso. L. Suber latifolium perpetuo virens. T. *Le liege.*
V. toutes ces especes sont astringentes.
339. JUGLANS. MASC. Cal. 1-phyllus squamiformis. Cor. 6-partita. *Filamenta* 18.
FEM. Cal. 4-fidus , superus. Cor. 4-partita. *Styli* 2. *drupa* nucleo fulcato.
- Regia.* J. Foliolis ovalibus glabris subserratis subæqualibus. L. Nux juglans regia vulgaris. T. *Le noyer.*
V. émétique , vermifuge.
340. FAGUS. MASC. Cal. 5-fidus. Campanulatus. Cor. 0. *stam.* 12.
FEM. Cal. 4-dentatus. Cor. 0. *styli* 3. *capsula.* (calix antea) muricata. 4-valvis. *Sem.* 2.
- Castanea.* F. Fol. lanceolatis. Acuminato-ferratis subtus nudis. L. Castanea fativa. T. *Le châtaignier.*
V. astringente , nourrissante.
- Sylvatica.* F. Fol. ovatis obsolete ferratis. L. T. *Le hêtre.*
V. détensive , astringente.
341. CORYLUS. MASC. Cal. 1-phyllus : 3-fidus , squamiformis , 1-florus. Cor. 0. *stam.* 8.
FEM. Cal. diphyllus lacerus. Cor. 0. *styli* 2. nux ovata.
- Avellana.* C. Stipulis ovatis obtusis. L. Corylus sylvestris. T. *Le noisetier.*
V. nourrissante , pectorale.

Monadelphia.

342. PINUS. MASC. Cal. 4-phyllus. Cor. 0. *stam.* plu:

- rima *anthæræ nudæ*.
 FœM. *Cal.* strobili : squama biflora. *Cor.*
 o. *piſt.* 1. *nux* ala membranacea excepta.
- Sylveſtris.* P. Foliis geminis : primordialibus ſolitariis
 glabris. L. *Pinus vulgaris.* T. *Le pin*
sauvage.
 V. diurétique , anti-ſcorbutique.
- Pinea.* P. Fol. geminis : primordialibus ſolitariis
 ciliatis. L. *Pinus ſativa.* T. *Le pin.*
 V. aphrodiſiaque , nourriſſante.
- Abies.* P. Fol. ſolitariis ſubulatis mucronatis lævi-
 bus bifariam verſis. L. *Abies tenuiori*
folio fructu deorſum inflexo. T. *Le*
ſapin.
 V. diurétique , anti-ſcorbutique.
343. CUPRESSUS. MASC. *Cal.* amenti ſquama. *cor.* o.
antheræ 4. ſeffiles abſque filamentis.
 FœM. *cal.* ſtrobili : ſquama 1-flora. *cor.*
 o. *ſtyli* ? Puncta concava *nux* angulata.
- Semper virens.* C. Foliis imbricatis , frondibus quadrangulis.
 L. *Cupreſſus meta infaſtigium con-*
voluta. T. *Le cyprès.*
 V. aſtringente , fébrifuge.
344. RICINUS. MASC. *cal.* 5-partitus. *cor.* o. *ſtam.* nu-
 meroſa.
 FœM. *cal.* 3-partitus. *cor.* o. *ſtyli* 3-
 bifidi *capſ.* 3-locularis. *Sem.* 1.
- Communis.* R. Foliis peltatis ſub palmatis ſerratis. L.
 T. *Le ricin.*
 V. purgative , violent vermifuge.

Syngeneſia.

345. MOMORDICA. MASC. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-parti-
 ta filamenta 3.
 FœM. *Cal.* 5-fidus. *cor.* 5-partita *ſtylus*
 3-fidus. *Pomum* elatiſce diſſiliens.
- Balzamina.* M. Pomis angulatis tuberculatis , foliis gla-

- bris patenti palmatis. L. *Momordica vulgaris*. T. *La pomme de merveille*.
V. vulnéraire.
- Elaterium*. M. Pomis hispidis, cirrhis nullis. L. *Cucumis sylvestris alininus* dictus. T. *Le concombre d'âne*.
V. purgative, hydragogue, résolutive.
346. CUCURBITA. MASC. cal. 5-dentatus. cor. 5-fida filamenta 3.
FÆM. Cal. 5-dentatus. cor. 5-fida *pystyl.* 5-fidum. *Pomi semina* margine tumido.
- Lagenaria*. C. Fol. subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis. L. T. *La calebasse*.
- Pepo*. C. Fol. lobatis, pomis lævibus. L. *Pepo oblongus*. T. *La courge de St. Jean*.
- Citrullus*. C. Fol. multipartitis. L. *Anguria citrullus* dicta. T. *La citrouille ou pastèque*.
V. toutes ces especes sont rafraîchissantes, humectantes.
347. CUCUMIS. MASC. cal. 5-dentatus. cor. 5-partita. Filamenta. 3.
FÆM. cal. 5-dentatus. cor. 5-partita. *Pist.* trifidum. *Pomi sæmina* arguta.
- Colocynthis*. C. Fol. multifidis, pomis globosis glabris. L. *Colocynthis fructu rotundo*. T. *La coloquinte*.
V. purgative, hydragogue.
- Melo*. C. Foliorum angulis rotundatis, pomis turulosis. L. *Melo vulgaris*. T. *Le melon*.
V. humectante, rafraîchissante.
- Sativus*. C. Foliorum angulis rectis, pomis oblongis scabris. L. T. *Le concombre de jardin*.
V. humectante, rafraîchissante.
348. BRYONIA. MASC. cal. dentatus. cor. 5-partita filamenta 3.
FÆM. cal. 5-dentatus. cor. 5-partita *stylus* 4-fidus. *Bacca* subglobosa, polyperma.

- Alba.* B. Foliis palmatis utrinque calloso-scabris.
L. Bryonia alba baccis nigris. T. *La bryoine.*
V. purgative, hydragogue.

 CLASSIS XXII^a. DIOECIA.

Diandria.

349. SALIX. MASC. *Amenti squamæ. cor. o. glandula*
baseos nectarifera.
FÆM. *Amenti squamæ. cor. o. stylus 2-*
fidus caps. 1-ocularis, 2-valvis. Sem.
papposa.
- Caprea.* S. Fol. ovatis rugosis subtus tomentosis un-
datis superne denticulatis. L. Salix lati-
folia rotunda. T. *Le saule marsau.*
V. *rafraichissante.*
- Alba.* S. Fol. lanceolatis acuminatis ferratis utrin-
que pubescentibus: ferraturis infimis
glandulosis. L. Salix vulgaris alba arbo-
rescens. T.
Le saule ordinaire.
V. *astringente, rafraichissante.*

Tetrandria.

350. VISCUM. MASC. *cal. 4-partitus. cor. o. filamentis*
o. antheræ calici adnatæ.
FÆM. *cal. 4-phyllus, superus. Stylus*
o. cor. o. bacca 1-sperma. Sem. corda-
tum.
- Album.* V. Foliis lanceolatis obtusis caule dichoto-
mo, spicis axillaribus. L. Viscum bac-
cis albis. T. *Le guy de chène.*

Pentandria.

351. PISTACIA. MASC. Amenti. *Cal.* 5-fidus. *cor.* o.
 FÆM. Distincta. *cal.* 3-fidus. *cor.* o. *styl.*
 2. *drupa* 1-sperma.
Vera. P. Fol. impari pinnatis, foliolis subovatis
 recurvis. L. *Terebinthus indica theophrasti*, seu *pistacia dioscoridis*. T. *Le pistachier*.
 V. nourrissante, stomachique.
Terebinthus. P. Fol. impari pinnatis : foliolis ovato-lanceolatis. L. *Terebinthus vulgaris*. T. *Le terebinthe*.
 V. résolutive, émolliente, vulnéraire, diurétique.
Lentiscus. P. Fol. abrupte pinnatis : foliolis lanceolatis. L. *Lentiscus vulgaris*. T. *Le lentisque*.
 V. astringente, stomachique.
352. SPINACIA. MASC. *cal.* 5-partitus. *Cor.* o.
 FÆM. *cal.* 4-fidus. *cor.* o. *styli* 4. *sem.*
 1, intra calycem induratum.
Oleracea. S. Fructibus sessilibus. L. *Spinacia mas & fœmina*. T. *Les épinards*.
 V. humectante, émolliente, laxative.
353. CANNABIS. MASC. *cal.* 5-partita. *cor.* o.
 FÆM. *cal.* 1-phyllus, integer, latere hians. *cor.* o. *styli* 2. *nux* bivalvis, intra calycem clausum.
Sativa. Cannabis. L. *Cannabis mas & fœmina*. T. *Le chanvre*.
 V. diurétique, emménagogue, apéritive.
354. HUMULUS. MASC. *cal.* 5-phyllus. *cor.* o.
 FÆM. *cal.* 1-phyllus, oblique patens, integer. *cor.* o. *styli* 2. *sem.* 1, intra calycem foliatum.

Lupulus

Lupulus.

Humulus. L. Lupulus mas & foemina.
 T. *Le houblon.*
 V. apéritive, diurétique, sudorifique.

Hexandria.

355. TAMUS. MASC. *cal. 6-partitus. cor. o.*
 FÆM. *cal. 6-partitus. cor. o. stylus. 3*
fidus. Bacca 3-ocularis infera. Sem. 2.
Communis. T. Foliis cordatis indivisis. L. Tamus ra-
cemosa flore minore luteo pallescente.
 T. *Le sceau de la Vierge.*
 V. apéritive, diurétique, emménagogue.
356. SMILAX. MASC. *cal. 6-phyllus. cor. o.*
 FÆM. *cal. 6-phyllus. cor. o. styli 3.*
bacca 3-ocularis sem. 2.
Aspera. S. Caule aculeato angulato, foliis denta-
to-aculeatis cordatis novem nerviis. L.
Smilax aspera fructu rubente. T. La
fausse salsepareille.
 V. sudorifique.

Octandria.

357. POPULUS. MASC. Amenti. *cal. lamina lacera. cor*
turbinata, obliqua, integra.
 FÆM. Amenti. *cal. & cor. maris. Stigma*
4-fidum. Caps. 2-ocularis. Sem. mul-
ta, papposa.
Alba. P. Foliis subrotundis dentato-angulatis sub-
tus tomentosis. L. T. Le peuplier blanc.
 V. diurétique.
Nigra. P. Fol. deltoidibus acuminatis ferratis. L.
 T. *Le peuplier noir.*
 V. astringente.
Balsamifera. P. Fol. ovatis ferratis subtus albidis, stipu-

N

lis resinosis. L. Le baumier.
V. anti-ulcereuse.

Enneandria.

358. MERCURIALIS. MASC. *Cal. 3-partitus. cor. o. flam. 9-f. 12. antheræ globosæ didymæ.*
 FÆM. *Cal. 3-partitus. cor. o. styli 2. caps. dicocca. 2-locularis, 1-sperma.*
Annua. M. Caule brachiato, fol. glabris, flor. spicatis. L. Mercurialis testiculata seu mas. T. La mercuriele.
V. laxative, émolliente.

Monadelpia.

359. JUNIPERUS. MASC. *Amenti calix squamæ. cor. o. flam. 3.*
 FÆM. *Cal. 3-partitus. Petala 3. styli 3. bacca 3-sperma, tribus tuberculis calycis inæqualis.*
Sabina. J. Fol. oppositis erectis decurrentibus; oppositionibus pyxidatis. L. T. La sabine.
V. diurétique, anthelmentique, emménagogue.
Communis. J. Fol. ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. L. T. Le génévrier.
V. résolutive, incisive, stomachique.

Syngenesia.

360. RUSCUS. MASC. *Cal. 6-phyllus. cor. o. nectarium centrale, ovatum, apice perforatum.*
 FÆM. *Cal. corolla & nectarium. maris. Stylus. 1. bacca 3-locularis sem. 2.*
Aculeatus. R. Fol. supra floriferis nudis. L. Ruscus myrtifolius aculeatus. T. Le houx frêlon.

V. diurétique, hydragogue.

Hypoglossum. R. Fol. subtus floriferis. Sub foliolo. L.

Ruscus angustifolius fructu folio innacente. T.

V. astringente.

CLASSIS XXIII^a. POLYGAMIA.

Monoecia.

361. VERATRUM. HERMAPHRÖD. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala
stam. 6. *pist.* 3. *caps.* 3, polyspermæ.
MASC. *Cal.* o. *cor.* 6-petala. *Stam.* 6.
pist. rudimentum.
Album. V. Racemo supra decomposito, corollis
erectis. L. Veratrum flore sub viridi. T.
L'ellebore blanc.
V. sternutatoire, purgative.
362. VALANTIA. HERMAPHRÖD. *Cal.* o. *cor.* 4-partita
stam. 4. *styl.* 2-fidus. *Sem.* 1.
MASC. *Cal.* o. *cor.* 3-f. 4-partita. *Stam.*
4-feu 3. *pistillum* obsoletum.
Cruciata. V. Flor. masculis 4-fidis, pedunc. diphyl-
lis. L. *Cruciata hirsuta*. T. *La croifette.*
V. vulnéraire, astringente.
363. PARIETARIA. HERMAPHRÖD. *Cal.* 4-fidus. *Cor.*
o. *stam.* 4. *styl.* 1. *sem.* 2, superum,
elongatum.
FÆM. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* o. *stam.* o. *styl.*
1. *sem.* 1, superum, elongatum.
Officinalis. P. Fol. lanceolato ovatis, pedunc. dicto-
tomis, calycibus diphyllis. L. T. *La*
pariétaire.
V. émolliente, diurétique.
364. ATRIPLEX. HERMAPHRÖD. *cal.* 5-phyllus. *cor.* o.

- flam.* 5. *styl.* 2-partitus. *Sem.* 1. depressum.
 FÆM. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 0. *flam.* 0. *styl.* bipartitus. *Sem.* 1. compressum.
Hortensis. A. Caule erecto herbaceo, fol. triangul-
 aribus. L. T. *L'arroche* ou *bonne-dame*.
 V. rafraîchissante, humectante, laxa-
 tive.

Dioecia.

365. FRAXINUS. HERMAPHROD. *Cal.* 0. seu 4-partitus.
Cor. 0. seu 4-petala. *flam.* 2. *pist.* 1.
sem. 1. lanceolatum.
 FÆM. *Pist.* 1. lanceolatum.
Excelsior. F. Foliolis ferratis, floribus apetalis. L.
 T. *Le frêne*.
 V. astringente.
Ornus. F. Foliolis ferratis, flor. corollatis. L. Fra-
 xinus florida botryoides. T. *Le frêne à*
fleur.
 V. purgative.

Trioecia.

366. CERATONIA. HERMAPHROD. *Cal.* 5-partitus. *Cor.*
 0. *flam.* 5. *styl.* filiformis. *Legumen* co-
 riaceum, polyspermum.
 DIOICA mas & fœmina distincta.
Siliqua. Ceratonia. L. *Siliqua* edulis. T. *Le*
caroubier.
 V. adoucissante, béchique.
 367. FICUS. *Receptaculum* commune turbinatum,
 carnosum, connivens, occultans flos-
 culos vel in eodem vel distincto.
 MASC. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 0. *flam.* 3.
 FÆM. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 0. *pist.* 1.
sem. 1.

Carica. F. Foliis palmatis. L. *Ficus fativa*. T. *Le figuier*.
V. adouçissante, expectorante, laxative.

CLASSIS XXIV^a. CRYPTOGRAMIA.

Filices.

368. EQUISETUM. *Spica* fructificationibus peltatis, basi dehiscentibus multivalvis.

Arvense. E. Scapo fructificante nudo; sterili frondoso. L. *Equisetum arvense longioribus setis*. T. *La queue de cheval*.
V. astringente.

369. OPHIOGLOSSUM. *Spica* articulata, disticha: articulis transversim dehiscentibus.

Vulgatum. O. Fronde ovata. L. T. *La langue de serpent*.
V. vulnèraire.

370. OSMUNDA. *Spica* ramosa: fructific. globosis.

Regalis. O. Frondibus bipinnatis: apice racemiferis. L. T. *La fougere fleurie*.
V. apèritive, vulnèraire, incisive.

371. ASPLENIUM. *Fructific.* in lineolis disci frondis sparsis.

Scolopendrium. A. Frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipit. hirsutis. L. *Lingua cervina officinarum*. T. *Le scolopendre*.
V. astringente, hépatique.

Ceterach. A. Frondibus pinnatifidis: lobis alternis confluentibus obtusis. L. T. *L'herbe dorée*.
V. apèritive, tonique.

Trichomanes. A. Frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis. L. *Trichomanes seu polytri-*

chum officinarum. T. *Le polytrich.*
V. hépatique.

Adiantum nigrum. A. Frondibus subtripinnatis : fol. alternis : pinnis lanceolatis inciso-ferratis. L. Filicula quæ adiantum nigrum officinarum pinnulis obtusioribus. T. *Le capillaire commun.*

V. béchique, apéritive, incisive.
Ruta muraria. A. Frond. alternatim decompositis : foliis cunei formibus crenulatis. L. Ruta muraria. T. *La sauve-vie.*
V. tonique, anti-scorbutique.

372. POLYPODIUM. *Fructific.* in punctis subrotundis, sparsis per discum frondis.

Vulgare. P. Frondibus pinnatifidis : pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata. L. T. *Le polypode.*
V. purgative, apéritive.

Filix mas. P. Frondibus bipinnatis : pinnis obtusis crenulatis, stipite paleaceo. L. Filix mas non ramosa dentata. T. *La fougere mâle.*
V. vermifuge.

373. ADIANTUM. *Fructific.* in maculis terminalibus subreplicato margine frondis.

Capillus veneris. A. Frondibus decompositis : foliolis alternis : pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis. L. Adiantum foliis coriandri. T. *Le capillaire de Montpellier.*
V. diurétique, apéritive.

Musci.

374. POLYTRICHUM. *anthera* operculata apophysi minime insidens. *Calyptra* villosa. *Stella* foeminea in distincto individuo.

Commune. P. Caule simplici antera parallelipeda. L. muscus capillaris minor capitulo longiore falcato. T.

V. sudorifique.

Algæ.

375. MARCHANTIA. MASC. *Calix peltatus subtus tectus*;
Corollis 1-petalis. antheræ multifidæ.
 FœM. *Cal. sessilis, campanulatus poly-*
permus.

Polymorpha. M. Calice communi decemfido. L. *Hepatica fontana.* T. *L'hépatique de fontaine.*
 V. hépatique, vulnéraire.

376. LICHEN. MASC. *Recept. subrotundum, planiusculum, nitidum.*
 FœM. *Farina foliis aspersa.*

Pulmonarius. L. Foliaceus laciniatus obtusus glaber : supra lacunofus subtus tomentosus. L. *Muscus pulmonarius five pulmonaria arbo-*
rea. T. *La pulmonaire des chênes.*
 V. astringente.

Islandicus. L. Foliaceus adscendens laciniatus : marginibus elevatis ciliatis. L.
 V. béchique.

Fungi.

377. AGARICUS. *Fungus horizontalis, subtus lamellosus.*

Quercinus. A. Acaulis, lamellis labyrinthiformibus. L. *L'agaric de chêne.*
 V. on s'en sert pour les hémorrhagies.

378. LYCOPERDUN. *Fungus subrotundus, seminibus farinaceis repletus.*

Tuber. L. Globosum solidum muricatum radice destitutum. L. *La truffe.*
 V. stomachique, nourrissante, aphrodisiaque.

Bovista. L. Subrotundum, lacerato dehiscens. L. *La vessè de loup.*

V. astringente , absorbante , incrassante.

Palmæ.

379. PHŒNIX. MASC. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala
stam. 3.

FŒM. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala *pis-*
til. 1. *drupa* ovata.

Dactylifera. P. Frondibus pinnatis : foliolis complicatis.
Ensiformibus. L. *Palma major.* T. *Le*
dattier.

V. adoucissante , astringente.

FINIS.



EXPLICATION

DES TERMES LES PLUS DIFFICILES.

I. POUR LES FLEURS.

BRACTEA, *Ecaille*, piece colorée qui soutient les
Calices.

Placenta, *Fonds du Calice*, receptacle des graines.

Pappus, *Aigrette*, composée de filets, ou simples, ou
plumeux, faits en barbe de plume.

Pedunculus, *Pédoncule*, ou queue seulement des fleurs,
ou des fruits, il est simple ou branchu.

Panicula, *Panache*, rameaux ou *Peduncules* formant
comme un émochoir, ou maniere de fouët.

Spica, *Epi*, rangée des fleurs ou des fruits, le long
d'une tige immédiatement, & fort près les unes des
autres.

Heteromalla, *Epi*, toute tournée du même côté.

Racemus, *Grappe*, est un pédoncule branchu, dont les
rameaux partent autour & le long d'un axe, & for-
ment avec leurs fleurs ou leurs fruits une masse sphé-
roïde.

Umbella,

Umbella, *Parasol*, assemblage de *Pédoncules*, qui partant d'un même point se répandent en rond, au lieu que ceux du *Panache* partent de divers points de la tige.

Umbellula partie du grand *Parasol*.

Involucrum, *Fraize*, ce sont des feuilles simples, ou composées autour du *Pédoncule* du grand *Parasol*, ou de chaque petite *Umbelle*.

Scapus, *Hampe*, baguette sans rameau, portant des fleurs.

Dichotomus, Branche ou tige fendue naturellement en deux, telles sont les mâches ou valerianelles & les pédoncules des *Tithymales*.

Monandria, *di-tri-tetra-polyandria*, à 1. 2. 3. 4. ou plusieurs étamines.

Icosandria, à plusieurs étamines, c'est-à-dire, au-dessus de douze, attachées aux parois du Calice.

Monostemon, *Distemon*, &c. à 1. 2. &c. *Étamines*.

Monogynia, *Digynia*, &c. à 1. 2. &c. *Pistilles*.

Monopetala, *di-tri-tetrapetala* à 1. 2. 3. 4. *Pétales*, ou pièces colorées de la fleur.

Labiatus, *Fleur en gueule*, elles sont monopétales, en tuyau évasé supérieurement en une ou deux *Lèvres*, appartenant à la *Didynamie* de M. Linn.

Cruciformis Fleur Tetrapetala en Croix, appartenant à la *Tetradynamie* de M. Linn.

Papilionaceus. *Fleur Légumineuse*, comme des Fèves, Pois, Vesses. Voyez la *Diadelphie* de M. Linn.

Flosculosus, *Fleur à Fleuron*, tuyau évasé en étoile, avec un pistille fendu en deux & 5. *Étamines* collées par leurs *Antheres*. Voyez la *Syngenesie*.

Semisflosculosus, *Fleur à demi Fleuron*, tuyau semblable au précédent, mais évasé en *Languette*.

Radiatus, *Fleur rayonnée*, ayant des *Fleurons* au milieu, & des *demi-Fleurons* au bord, ou rayon.

Focaneus *Fleur sessile*, du *Pédoncule* de laquelle s'élevaient d'autres fleurs plus haut montées, comme celles de *Impia*, *Dod. Carlina*, *Richierrii*, &c.

Prolifer, *Fleur prolifère*, du centre de laquelle sort

un Pédoncule chargé d'une autre fleur.

Androgynus, } fleurs mâles & fleurs femelles séparé-
Monoicus, } ment sur le même pié de plante.

Dioicus, Fleurs mâles sur un pié, & femelle sur l'autre.

Spatha, Calice des *Orchis*, *Arum*, *Mays*, *Pavots*, fait souvent en oreille d'Ane.

II. POUR LES FRUITS.

Drupa, fruit charnu à noyau.

Monopyrena, *Dipyrena*, &c. à un deux, &c. *Pepins*.

Angiospermus, à graines cachées dans une Boîte, Cornet, ou Gouffe.

Angiomono-di-trispermus à 1. 2. 3. Graines cachées.

Gymnospermus, à graine nue.

Gymnotetraspermus, à 4 graines nues comme les *Borraginées*, & *labiées*.

III. POUR LES FEUILLES.

Petiolus, *Pédicule*, ou queue des Feuilles seulement.

Stipula, *Aileron*, ou Oreillette feuillue au *Pédicule* des feuilles.

Segmentum, *Lacinia*, *Piece*, *Laniere* se dit des feuilles découpées jusqu'à la côte du milieu, quand ces pieces n'ont pas un *Pédicule* distinct.

Folium, la feuille, a au moins vers le *Pédicule*, une partie interne plane, & l'externe convexe. La feuille est ou simple ou composée, les Feuilles simples n'ont qu'un disque entier, & son *Pédicule* est attaché immédiatement aux tiges.

1°. Par rapport à la disposition.

Alternata, Feuilles alternes qui ne sont pas à la même hauteur, mais l'une plus haut, l'autre plus bas, de côté & d'autre.

Adversa, vel *opposita*, F. opposées, qui sont 2. à 2. diamétralement opposées.

Verticillata, F. *Verticillées*, qui au nombre de 3. au moins entourent la même zone horizontale de la tige, ou du rameau.

Sparsum, F. *Eparse*, qui ne répond pas diamétralement à aucune autre, ou qui est alterne.

Sessile, F. *Sessile*, qui n'a point de *Pédicule*.

Connatum, F. *Continue*, lorsque deux feuilles opposées se tiennent par leurs *bases*.

Perfoliatum, F. *percée & traversée* par la tige, ou par le rameau.

Decurrens, F. qui est *collée* en partie par son disque le long de la tige.

Semi-amplexicaule, F. qui *embrasse* la moitié de la tige par ses oreillettes, ses crochets, &c.

*Vaginan*s, F. en *Gaine*, c'est-à-dire, qui engaine la tige.

Peltatum, F. qui est soutenue par le pédicule appliqué non au bord, mais au *plan même du disque*, comme la tige à un *Parasol*, ou au Bouclier appelé *Pelta*.

Erectum, F. (ou branches) qui font supérieurement avec leur tige, un *Angle aigu*.

Patens, *patulum*, F. (ou Branche) quand ledit *Angle* est presque *droit*.

Imbricatum, F. couchée l'une sur l'autre, comme les *Briques*, ou *Tuiles* d'un toit.

2°. *Par rapport à la figure.*

Acuminatum, F. qui se termine par une *pointe fort aiguë*.

Retusum, se dit des feuilles non-seulement *obtus* par leur sommet, mais encore *échancrées* en cet endroit.

Ligulatum, F. en *Courroie* plus large que la tige.

Lineare, F. en *Ruban* plus étroit que la tige.

Oblongum, F. *oblongue*, dont la longueur surpasse trois ou 4 fois au moins la largeur, & dont les deux bouts sont étroits, mais arrondis.

Ovatum, F. *Ovale*, *Pointue*, dont la base est arrondie, & le sommet plus étroit.

Lanceolatum, F. en *Fer de Pique*, qui du milieu large, va en pointe vers les 2 bouts, ou au moins vers le sommet.

Spatulatum, F. en *Espatule d'Apothicaire*.

3°. *Par rapport aux découpures.*

Crenatum, F. *Crenelée*, qui a des avances convexes sur ses bords, regardant en tout sens, au lieu que les *dentelures* regardent souvent le sommet.

Serratum, F. *dentelée*, qui a des avances légères sur ses bords, à angles aigus, & contigues en dent de *Scie*.

Dentatum, F. *Dentée*, qui a des avances rectangulaires sur les bords, souvent assez légères.

Sinuatum, F. *Sinuée*, échancrée profondément sur ses côtes par des brèches courbes.

Bilobum, *Trilobum*, &c. F. à 2. 3. *Lobes* qui a vers le sommet 2. 3. avances arrondies & peu saillantes.

Bifidum, *Trifidum*, &c. F. dont les susdites avances ne sont pas arrondies.

Bipartitum, *Tripartitum*, &c. F. découpée du sommet vers la base, presque jusqu'au *Pédicule*, en 2. 3. ou plusieurs parties.

Lyratum, F. en *Lyre*, ou *Luth*, ayant au sommet une grande pièce *ovale* ou en fer de pique, & plusieurs *Pinnules*, comme les chevilles du *Luth*, au *Pédicule*.

Laciniatum, F. *Laciniée*, découpée latéralement, dont les *Lanieres* sont elles-mêmes encore sinuées & découpées.

Palmatum, F. en *main ouverte*, dont les segmens n'ont pas des *Pédicules* distincts.

Pinnatifidum, F. sinétriement découpée, dont les *Lanieres* se répondent de côté & d'autre, ou à peu près.

Semipinnatum, F. découpées latéralement à l'opposite, sans que les découpsures parviennent jusqu'à la côte commune ou *Rachis*.

Hastato-pinnatum, F. qui par ses découpsures représente les *Crochets* divergens d'une *Hallebarde*.

Sagitato-pinnatum, F. dont les pièces ou crochets sont repliés vers le *Pédicule*.

4°. Par rapport à la multiplicité des feuillets.

Folium compositum, F. composée dont le *Pédicule* est divisé, ou même subdivisé en d'autres, avant de soutenir les pièces du disque ou feuillet, lesquelles pièces ou feuillets tombent ensemble avec le *Pédicule* commun.

Foliolum, *Feuillet*, ou la pièce de la feuille composée, ayant son *Pédicule* propre.

Ternatum, *Feuille en Trèfle*, qui a trois feuillets, dont les *Pédicules* partent tous d'un centre commun.

Biternatum, F. qui a trois *pédicules* ensemble, dont chacun soutient trois feuilletts.

Digitatum, F. en *Éventail*, qui a plus de trois feuilletts, partant tous d'un centre commun.

Pinnatum, F. *conjuguée*, ou composée de plus de trois feuilletts posés sur le même plan, non autour d'un centre commun, mais le long d'une côte commune, & à côté de cette côte; si ces feuilletts sont à l'opposite, c'est proprement *Pinnatum*, s'ils sont alternes ou sans ordre, c'est *Pennatum*.

Bipinnatum, F. *conjuguée*; qui renvoie de sa côte des feuilletts également conjugués, & dont les côtes sont encore ou à l'opposite, ou rangées sans ordre, mais toujours sur le même plan; le *Bignonia*, l'*Azederach*, &c. sont de cette sorte: on voit par-là ce que c'est que *Tripinnatum*, *quadripinnatum*, &c.

Pinnato-digitatum, F. dont les feuilletts partent du bout du *Pédicule* commun, fort près l'un au-dessus de l'autre.

Alatum, F. *Ailée* se dit des F. *Bipinnées* ou encore plus composées dans la sous-division de leurs *Pédicules*, mais dont les derniers feuilletts sont *déchiquetés* ou laciniés. *Pinnatifida*, & ces déchiquetures, qu'on appelle *Pinnules*, *Pinnæ*, vel *Pinnulæ*, n'ont pas un *Pédicule* distinct, souvent même ces derniers feuilletts sont réunis ensemble, comme dans la *Ciguë*, le *Mirrhis*, le *Daucus*, &c.

5°. Par rapport au Tissue.

Glabrum, F. sans poil.

Hispidum, F. hérissée de poils roides, mais fragiles.

Pubescens, F. blanchâtre par son Duvet.

Tomentosum, F. drapée & cotoneuse.

Villosum, F. velue.

Nervosum, F. nerveuse, qui a au moins trois *Nerveuses*, qui du sommet du *Pédicule* se répandent ça & là dans la feuille.

Venosum, F. veineuse, qui n'a qu'une côte commune le long de son axe, de laquelle côte partent latéralement plusieurs fibres, ou alternes, ou à l'opposite.

Filiformis, se dit des *Stolones* ou sarmaux & rameaux
longs, flexibles faits en cordons.

Clavicula , } Vrilles, Mains.
Capreolus , }



A MONTPELLIER,

De l'Imprimerie de JEAN-FRANÇOIS PICOT, seul Imprim-
meur du Roi & de la Ville, Place de l'Intendance.

1786.