

SUITES
A
BUFFON

PLANCHES
à Livraison

POISSONS.

PARIS
A LA LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET.
Rue Hautefeuille, N°12.

HISTOIRE NATURELLE
DES
POISSONS
OU
ICHTHYOLOGIE GÉNÉRALE

PAR

AUG. DUMÉRIL

PROFESSEUR-ADMINISTRATEUR AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE DE PARIS

ATLAS

PARIS

LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET,
12, RUE HAUTEFEUILLE.

1865

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.

EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE 1.

Diverses portions du squelette des Plagiostomes.

Fig. 1, 2, 7 et 8. Colonne vertébrale, dépendances et détails (*Alopias vulpes*).

Fig. 3 et 4. Idem (*Rhina squatina*).

Fig. 5 et 6. Idem (*Rhynchobatus laevis*).

Les mêmes lettres indiquent les mêmes parties dans chacune de ces figures.

a corps ou centre de la vertèbre (t. I, p. 17, 24 et 25).

b cartilages cruraux (*id.*, p. 17 et p. 23).

c cartilages intercruraux (*id.*, p. 17).

d (fig. 3 et 4) cartilages surcruraux (*id.*, p. 18).

e (fig. 4 et 5) cartilages supérieurs supplémentaires (*id.*, p. 19).

f, f' cartilages transverses ou parapophysés (*id.*, p. 19 et 22).

g (fig. 1) rayons de la nageoire caudale (*id.*, p. 20).

h (fig. 2, 3, 5 et 6) cartilages costaux (*id.*, p. 20 et 21).

i, i' (fig. 1, 2 et 5) orifices pour la sortie des nerf rachidiens (*id.*, p. 23).

j (fig. 1) orifices pour la sortie des vaisseaux (*id.*, p. 24).

Fig. 9. Nageoire pectorale dont on ne voit que les premières rangées de rayons, et cartilages des branchies (*Raja clavata*).

k crête médiane de la portion indivise de la colonne vertébrale (*id.*, p. 14 et 15).

l bord relevé de la lame latérale de cette même tige (*id.*, p. 14 et 15).

m moitié interne et supérieure de la ceinture scapulaire (*id.*, p. 33).

n-s cartilages analogues des os du carpe (*n*, le médian; *o, p*, le postér., composé de 2 pièces; *q, r, s*, l'antérieur composé de 3 pièces) (*id.*, p. 34).

Fig. 10. 2^e nageoire dorsale et nageoire caudale (*Raja clavata*) (*id.*, p. 43).

PLANCHE 2.

Portion antérieure de l'axe cérébro-spinal de divers Plagiostomes et de poissons osseux et origine des nerfs encéphaliques (t. I, p. 66-74).

- Fig. 1, 2 et 3. *Raja clavata* (en dessus, en dessous et coupe latérale).
 Fig. 4 et 5. *Rhina squatina* (en dessus et en dessous).
 Fig. 6. *Mustelus vulgaris* (en dessus).
 Fig. 7. *Acanthias vulgaris* (en dessus).
 Fig. 8 et 9. *Abramis brama* (en dessus et coupe latérale).
 Fig. 10 et 11. *Conger vulgaris* (id., id.).
 Fig. 12. *Torpedo marmorata* (en dessus).

Les mêmes signes indiquent les mêmes parties sur chaque figure; mais toutes les lettres et tous les chiffres ne sont pas répétés sur toutes les figures, alors même que celles-ci montrent les parties que ces lettres et ces chiffres servent à désigner.

- 1 (fig. 10 et 11). Nerfs olfactifs. — 2 (fig. 1, 6, 8, 9, 10 et 11). Lobules olfactifs. — 3 (fig. 1-9 et 12). Processus olfactifs. — 4 (fig. 1-12). Lobes cérébraux. — 5 (fig. 8, 10 et 11). Glande pinéale. — 6 (fig. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11). Tubercules bi-jumeaux. — 7 (fig. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11). Cervelet. — 8 (fig. 1, 4, 6, 7). Lamelles latérales de la moelle allongée. — 9 (fig. 3). Ventricule latéral. — 10 (fig. 2, 3, 9, 11). Lobes inférieurs de la moelle allongée. — 11 (fig. 3). 3^e Ventricule ou ventr. moyen. — 12 (fig. 3, 11). Infundibulum. — 13 (fig. 3). Aqueduc de Sylvius. — 14 (fig. 2, 3, 5, 9, 11). Corps et tige pituitaires. — 15 (fig. 3, 4, 6, 7, 11). 4^e Ventricule. — 16 (fig. 2, 5, 7). Sacs vasculaires. — 17 (fig. 3, 5, 6, 9, 11). Moelle allongée. — 18 (fig. 2). Pyramides antérieures — 19 (fig. 8, 9, 10 et 11). Lobes supérieurs de la moelle allongée. — 20 (fig. 9 et 11). Cotylédons. — 26 (fig. 9 et 11). Commissure antérieure. — 27 (fig. 1, 3, 4, 6, 7, 12). Racine supérieure des nerfs optiques.
 28 (fig. 12). Lobes électriques.

(21-25 désignent des portions de l'encéphale des poissons osseux non visibles sur la pl. 2).

(Les lettres suivantes sont marquées seulement sur les figures 1 et 2).

- A (fig. 1). Ramuscules olfactifs (la lettre manque sur la planche): ce sont les petits filets nerveux qui, des lobes olfactifs 2 (fig. 1) se rendent dans la membrane muqueuse des cavités nasales. — B Nerf optique. — C Nerf moteur oculaire commun. — D Nerf pathétique. — E Nerf trijumeau. — F Nerf acoustique. — G Nerf moteur oculaire externe. — H Nerf des deux premières branchies, représentant peut-être le nerf facial, à cause de ses rapports avec le nerf acoustique dans la cavité auditive. —

I Nerf pneumogastrique. — J Racine antérieure du premier nerf spinal. — (Il n'y a pas de nerf hypoglosse, ni de nerf glosopharyngien nettement reconnaissables. Il n'y a pas de nerf facial comparable au facial des animaux supérieurs).

PLANCHE 3.

- Fig. 1 et 3. Dents supér. et infér. Fig. 2. Dents supér. et médianes (*Mustelus vulgaris*, t. I, p. 400).
 Fig. 4-6. Mêmes dents de *Must. laevis* (*Id.*, p. 401).
 Fig. 7 et 8. Dents médianes des mâchoires supérieure et inférieure (*Heterodon Philippi*). — 9 et 10, id. (*Id.*, plus jeune). — Fig. 11-13. Scutelles du même : (11 et 12, scut. dorsales, en dessus et de profil; 13, scut. des crêtes surciliaires; 14, scut. de la région abdominale; 15, scut. de l'extrémité du museau), t. I, p. 89, 139 et 424. — Fig. 16 et 17. Dents médianes des mâchoires supérieure et inférieure (*Heterodon Quoyi*), t. I, p. 427.
 Fig. 18. Dents du *Selache maxima*, t. I, p. 135, 136 et 413.

PLANCHE 4.

- Fig. 1 et 2. Dents de l'extrémité antérieure des mâchoires supérieure et inférieure (*Heptanchus cinereus*). — Fig. 3. 6^e dent latérale inférieure, et fig. 4, 5^e dent latérale supérieure (*Id.*), t. I, p. 136, 432 et 433.
 Fig. 5 et 6. Dents de l'extrémité antérieure des mâchoires supérieure et inférieure (*Heptanchus indicus*). — Fig. 7. 6^e dent latérale inférieure, et fig. 8, 5^e dent latérale supérieure (*Id.*), t. I, p. 136 et 434.
 Fig. 9 et 10. Dents de l'extrémité antérieure des mâchoires supérieure et inférieure (*Hexanchus griseus*). — Fig. 11. 6^e dent latérale inférieure, et fig. 12, 5^e dent latérale supérieure (*Id.*), t. I, p. 136 et 431.
 Fig. 13. Appendice génital ♂, et fig. 14, scutelles épineuses très-amplifiées (*Spinax niger*), t. I, p. 89, 235 et 441.

PLANCHE 5.

- Fig. 1. Dents de la mâchoire inférieure (*Scymnus [Lamargus] borealis*) vues par leur face antérieure, et fig. 2, vues par leur face postérieure, t. I, p. 132, 137 et 435. — Fig. 3 et 4. Id. (*Scymnus [Lamargus] brevipinna*), t. I, p. 132, 137 et 436.
 Fig. 5. Scutelles (*Rhina squatina*), t. I, p. 464; fig. 6, id. (*Rh. Dumérilii*), p. 467; fig. 7, id. (*Rh. aculeata*), p. 465.

- Fig. 8 et 9. Scutelles (*Oxynotus centrina*) en dessus et de profil, t. I, p. 444.
- Fig. 10. Scutelles (*Centroscyllum Fabricii*), t. I, p. 449.
- Fig. 11, 12 et 13. Scutelles en dessus, en dessous et de profil; et fig. 14 et 15, dents de l'extrémité antérieure des mâchoires supérieure et infér. (*Centrophorus squamosus*), t. I, p. 90 et 448.
- Fig. 16 et 17. Dents de l'extrémité antérieure des mâchoires supérieure et inférieure, et fig. 18, scutelles (*Centrophorus granulatus*), t. I, p. 88, 90 et 447.

PLANCHE 6.

- Fig. 1. Mâchoires de la Squatine (*Rhina squatina*), *a* maxillaire supérieur et intermaxillaire confondus; *b*, *c* cartilages labiaux supérieurs; *d* cartil. labial inférieur; *e* portion dentaire, et *f* portion articulaire du maxillaire inférieur, t. I, p. 30 et 31.
- Fig. 2, 3, 5. Dents supérieures médianes et latérales, et fig. 4, dents méd. infér. (amplifiées 6 et 7 fois) de *Cephaloptera Eregoodo*, p. 653.
- Fig. 6 et 7. Dents méd. supér. et infér. (amplifiées 6 fois) de *Ceph. Giorna*, p. 653.
- Fig. 8. Dents méd. (amplifiées 4 fois) de *Ceph. Olfersii*, p. 657.
- Fig. 9. Dents infér. et 9*a*, dents supér. de *Ceph. Kuhlii*, p. 654.
- Fig. 10. Armure épineuse du bord supér. de la nageoire caudale du *Pristiurus melanostomus*, t. I, p. 91 et 324.
- Fig. 11. Portion antérieure de la tête de la *Raja chagrinea*, t. I, p. 92 et p. 560, et fig. 12, id. (*Raja fullonica*), p. 92 et 554.

PLANCHE 7.

- Fig. 1. Dents, et fig. 2, scutelles de Roussette (*Scyllium catulus*), t. I, p. 90, 140 et 312.
- Fig. 3. Dents de l'*Odontaspis taurus*, p. 140, 141 et 417.
- Fig. 4. Id. de l'*Oxyrhina Spallanzanii*, p. 140, 141 et 407.
- Fig. 5. Scutelles et gros tubercules médians du dos (*Hypolophus sephen*), t. I, p. 90 et 617, à la fin de la description.
- Fig. 6. Tubercules cutanés de l'*Urogymnus asperrimus*, t. I, p. 90, sous le nom de *Anacanthus asperr.* et 580.
- Fig. 7. Dent de *Carcharodon Rondeletii*, t. I, p. 135 et 411.
- Fig. 8, 9 et 10. Dents, et fig. 11 et 12, scutelles de *Raja chagrinea*, t. I, p. 132, 141 et 561.
- Fig. 13-15. Dents de *Raja Gaimardi*, t. I, p. 141 et 565.
- Fig. 17. Scutelles de *Raja fullonica*, p. 555, à la fin de la descript.

PLANCHE 8.

Œufs de Plagiostomes et de Chimères.

- Fig. 1. *Scyllium*, *a*, *a* fentes latérales, *b* fente terminale, t. I, p. 247, 248 et 312. — Fig. 2 et 3. *Heterodon Philippi* ou *Crossorhinus barbatus*, l'œuf entier et suivant une coupe longitudinale, p. 249. — Fig. 4, 5 et 6. Portions de l'enveloppe d'un œuf de Raie pour en montrer la structure, p. 250. — Fig. 7. L'un des prolongements angulaires d'un œuf de Raie, p. 252. — Fig. 8. Œuf de Chimère, et fig. 9, l'une de ses extrémités où se voient deux fentes parallèles, p. 653.

PLANCHE 9.

Becs de Scies.

- Fig. 1. *Pristis antiquorum*, t. I, p. 473. — Fig. 2. *Pr. Perrotletii*, p. 474. — Fig. 3. *Pr. pectinatus*, p. 475. — Fig. 4. *Pr. megalodon*, p. 476. — Fig. 5. *Pr. cuspidatus*, p. 476. — Fig. 6 et 6a. *Pr. semi-sagittatus*, p. 477. — Fig. 7. Coupe transversale du bec du *Pr. antiquorum*, près de sa base, t. I, p. 29, où cette fig. est indiquée, à tort, comme se trouvant sur la pl. 7.

PLANCHE 10.

- Fig. 1. Portion du museau (gr. natur.), vu en dessous, du *Rhinobatus* (*Syrrhina*) *Bougainvillei*, où l'on voit la disposition des valvules nasales antérieures caractéristiques du sous-genre *Syrrh.*, et celle du système dentaire propre à cette espèce; *1a* et *1b*, dents supér. et infér. grossies, t. I, p. 436, 485 et 491. — Fig. 2. Museau (gr. natur.), vu en dessous, du *Rhinobatus* (*Rhinobatus*) *Thouini*, où l'on voit la disposition des valvules nasales antérieures caractéristiques du sous-genre *Rhinob.*; *2a* et *2b*, dents supér. et infér. grossies, t. I, p. 485 et 500. — Fig. 3. Scutelles de *Rhinob.* (*Rhinob.*) *cemiculus*, t. I, p. 495. — Fig. 4. Id. (*Rhinob.* [*Rhinob.*] *armatus*), p. 491. — Fig. 5. Id. (*Rhinob.* [*Syrrhina*] *Blochii*), p. 488. — Fig. 6. Id. (*Rhinob.* [*Syrrh.*] *annulatus*), p. 487. — Fig. 7. Id. (*Rhinob.* [*Syrrh.*] *Columnæ*), p. 486.

PLANCHE 11.

Bouches de Torpéidiens (Narcines) montrant les différences que présentent les orifices des narines, la valvule nasale, les plaques dentaires et les dents elles-mêmes, t. I, p. 132 et 513.

- Fig. 1. *Narcine indica*, *1a*, dents, t. I, p. 517. — Fig. 2. *Narc. maculata*, *2a*, dents, p. 518.

Fig. 3. *Narc. brasiliensis*, 3 a, dents, p. 514.

Fig. 4. *Narc. nigra*, 4 a, dents, p. 515.

PLANCHE 12.

Fig. 1. Museau vu en dessous (*Raja nævus*); fig. 2 et 3, dents, *Id.*; t. I, p. 549.

Fig. 4. Museau vu en dessous (*Raja falsavela*); fig. 5 et 6, dents, *Id.*; p. 550.

Fig. 7-10. Boucles de *Raja clavata*, t. I, p. 92 et 528.

Fig. 11 et 12. Tubercules épineux de la queue (*Raja capensis*), p. 92 et 540.

Fig. 13 et 14. Scutelles épineuses (*Raja eglanteria*), p. 93 et 532.

Fig. 15. Boucles (*Raja radiata*), p. 92 et 531.

Fig. 16-20. Boucles (*Echinorhinus spinosus*), p. 92, 93 et 459.

PLANCHE 13.

Fig. 1 et 2. Tête vue en dessous et de profil de *Callorhynchus antarcticus*; fig. 1 a, lambeau cutané du prolongement rostral, et 1 b, dents antérieures de la mâchoire supérieure (*id.*), t. I, p. 690 et 693.

Fig. 3 et 4. Tête vue en dessous et de profil de *Chimæra monstrosa*, p. 678 et 686.

Fig. 5. Lambeau cutané du prolongement rostral, et fig. 5 a, dents antérieures de la mâchoire supérieure du *Callorhynchus capensis*, p. 690 et 695.

PLANCHE 14.

Fig. 1. Lame épineuse située au-devant de la nageoire ventrale, et portion de la ceinture pelvienne qui la supporte et la loge (*Chimæra monstrosa* ♂), t. I, p. 688.

Fig. 1 a. Prolongement sus-céphalique épineux (*Id.*), t. I, p. 682.


Fig. 2. Les mêmes parties chez le *Callorhynchus antarcticus* ♂, p. 681.

Fig. 2 a. Epines amplifiées de la lame ventrale (*Id.*).

Fig. 2 b. Prolongement sus-céphalique épineux (*Id.*, p. 694).

Fig. 3. Moitié de la ceinture pelvienne (*Chimæra monstrosa* ♀) (*Id.*, p. 682).

Fig. 4. *Callorhynchus Peronii*, et fig. 4 a, épines dorsales du même, amplifiées (t. I, p. 676 et 695).




Huet del.

Corbié sc.

Détails du squelette : Squeles et Raies.



Imp. Roret, 22, r. Hautefeuille, Paris.




Huet del.

Encéphales : Squales et Raies .















Corbié sc.



Huet del.

Corbié sc.

Dents et scutelles de Squales .




Huet del.

Corbié sc.

Dents de Notidaniens - Spinax noir.






Huot del.

Corbié sc.


Dents et Scutelles: Scymniens. Squatines. Spinaciens .



Huet del.

BU LILLE
Corbié sc.

Raies chaëgrinée et chardon. Dents de Céphaloptères. Squatine .



Huet del.



Carbié sc.

Dents et scutelles de Squales et de Raies.




Illet del.





Corbié sc.

Eufs de Plagiostomes et de Chimère.



Bees de Scies.






Huet del.

Corbié sc.

Raies nævus et fausse-voile. Epines de raies.




Huet del.

Corbié. sc.

Chimère et Callorhynques.





Huet del.



Corbié sc.

Chimère et Callorhynques

HISTOIRE NATURELLE
DES
POISSONS

ATLAS

BAR-SUR-SEINE. — IMP. SAILLARD.

PLANCHE 15.

Têtes et revêtement cutané d'Esturgeons.

Fig. 1, 1a, 1b. *Acipenser (Antaceus) Alexandri*, t. II, p. 239.

a, plaque occipitale supérieure (t. II, p. 45); — b, nuchale (*id.*); — c, mastoïdienne (*id.*); — d, pariétale (*id.*, p. 46); — e, temporale (*id.*); — f, frontale principale (*id.*); — g, ethmoïdale ou frontale moyenne (*id.*); — h, frontale antérieure (*id.*, p. 47); i, frontale postérieure (*id.*); — l, nasale (*id.*); — m, rostrales supérieures (*id.*); — p, sus-scapulaire (*id.*); — v, premier écusson dorsal (*id.*, p. 50); — w, opercule (*id.*, p. 73);

(Pour les plaques des régions latérales et inférieure de la tête, voy. l'explication des fig. de la pl. 19.)

Fig. 2, 2a, 2b. *Acipenser (Huso) Gillii*, t. II, p. 110.Fig. 3, 3a, 3b. *Id. (Id.) Kennicottii* (*id.*, p. 130).Fig. 4, 4a, 4b. *Id. (Id.) anthracinus* (*id.*, p. 126).

PLANCHE 16.

Têtes et revêtement cutané d'Esturgeons.

Fig. 1, 1a. *Acipenser (Huso) Lesueurii*, t. II, p. 166.Fig. 2, 2a. *Acipenser (Id.) simus* (*id.*, p. 173).Fig. 3, 3a. *Acipenser (Id.) rostellum* (*id.*, p. 173).Fig. 4, 4a, 4b. *Acipenser (Id.) brevirostrum* (*id.*, p. 170, où est omise l'indication de la fig.), et p. 180.

PLANCHE 17.

Têtes, barbillons et scutelles cutanées d'Esturgeons.

Fig. 1, 1a, 1b. *Acipenser (Huso) laevis*, t. II, p. 151.Fig. 2, 2a, 2b. *Id. (Id.) rosarium* (*id.*, p. 152).Fig. 3, 3a, 3b. *Acipenser (Antaceus) brachyrhynchus* (*id.*, p. 221).Fig. 4. Barbillon de *Acip. (Huso) atelaspis* (*id.*, haut de la p. 142).Fig. 5. *Id.*, *Id. (Id.) Kirtlandii* (*id.*, p. 161).Fig. 6. *Id.*, *Id. (Id.) Kennicottii* (*id.*, p. 130).Fig. 7. Scutelles cutanées de *Acip. (Lioniscus) glaber* (*id.*, p. 53).Fig. 8 et 9. *Id.*, *id.*, *Id. (Huso)* (*id.*, p. 53). Voy., en outre, pl. 13, fig. 2b, 3b, 4b.Fig. 10. *Id.*, *id.*, *Id. (Ac. sturio)* (*id.*, p. 53).

PLANCHE 18.

Têtes et revêtement cutané d'Esturgeons.

Fig. 1, 1a, 1b. *Acipenser (Antaceus) Caryi* (t. II, p. 224).

- Fig. 2, 2a, 2b. *Acipenser (Antaceus) Ayresii* (*id.*, p. 226).
 Fig. 3, 3a, 3b. *Id. (Id.) Agassizii* (*id.*, p. 237).
 Fig. 4, 4a, 4b. *Id. (Id.) medirostris* (*id.*, p. 222). Voy., en outre, pour les scutelles du sous-genre *Antaceus*, pl. 15, fig. 1b (*id.*, p. 53).

PLANCHE 19.

Têtes d'Esturgeons. — Polyodon Gladius. — Ecailles de Lépidostés.

- Fig. 1. *Acipenser (Antaceus) Buffalo*, tête vue de profil (t. II, p. 231).
h et *i* plaques frontales antérieure et postérieure (t. II, p. 47).
 Voy., en outre, pl. 15, fig. 1, *h, i, l, p, v*.
j, plaque postorbitaire (*id.*, p. 47); — *k*, sous-orbitaire (*id.*); —
l, nasale (*id.*); — *n*, rostrales latérales (*id.*); — *p*, sus-scapu-
 laire (*id.*); — *q*, scapulaire (*id.*, p. 48); — *z*, écussons latéraux
 (*id.*, p. 51). Voy., en outre, pl. 15, fig. 1a et sur toutes les au-
 tres pl.; — *u*, évent (*id.*, p. 72); — *v*, premier écusson dorsal
 (*id.*, p. 50).
 Fig. 2. *Acipenser (Acip.) ruthenus*, tête vue en dessous (*id.*, p. 246).
o, écussons vomériens (*id.*, p. 47); — *r*, plaque pectorale (*id.*, p. 48).
 Voyez pour les autres plaques, pl. 15, fig. 1, et pl. 19, fig. 1.
 Fig. 2a. Canaux muqueux de la peau à la face inférieure du museau
 de *Acip. ruthenus* (*id.*, p. 42).
 Fig. 3. *Polyodon Gladius* (*id.*, p. 287).
 Fig. 4. Ecailles de *Lepidosteus Harlani*.
 Fig. 5. *Id.* de *Cylindrosteus Castelnaudii*.
 Fig. 6. *Id.* de *Atractosteus tristachus*.

Voy. l'explication de la pl. 21.

PLANCHE 20.

- Fig. 1 et 2. Portion antérieure de l'axe cérébro-spinal de l'Esturgeon ordinaire (*Acipenser [Acipenser] sturio*) et origine des nerfs encéphaliques. — Voy. pour l'étude comparative de cette portion du système nerveux central, la pl. 2 du présent ATLAS, la p. 4 de l'Explication des planches, ainsi que les détails contenus dans le t. I, p. 66-74, et t. II, p. 38-40.

Afin d'établir une concordance entre les pl. 2 et 20, et celles de l'Atlas encore inédit de MM. Philipeaux et Vulpian (voy. t. I, p. 67), partout, le même chiffre ou la même lettre se rapporte au même organe. Les chiffres ou les lettres qui manquent désignent des portions du système nerveux central non visibles sur nos planches 2 et 20.

- 1 (fig. 1 et 2). Nerfs olfactifs. — 2 (fig. 2). Lobules olfactifs. —
 3 (fig. 1). Processus olfactifs. — 4 (fig. 1 et 2). Hémisphères
 cérébraux. — *e* (fig. 1). Pédoncules cérébraux. — *f* (fig. 1).

Couches optiques rudimentaires. — 6 (fig. 1). Tubercules bi-jumeaux ou lobes optiques. — 7 (fig. 1). Cervelet. — 8 (fig. 1). Lames latérales postérieures de la moelle allongée. — 10 (fig. 2). Ses lobes inférieurs. — 14 (fig. 2). Corps pituitaire. — 15 (fig. 1). 4^e ventricule. — 17 (fig. 1 et 2). Moelle allongée.

- Fig. 3. Scutelles cutanées de la région antérieure du dos du grand Esturgeon (*Acipenser* [*Huso*] *ichthyocolla*, t. II, p. 98).
 Fig. 4 et 4a. Tête et 6^e écusson dorsal de *Acip.* (*Huso*) *Fitzingerii* (*id.*, p. 97).
 Fig. 5 et 5a. Tête et 6^e écusson dorsal de *Acip.* [*Huso*] *Ducissæ* (*id.*, p. 98).
 Fig. 6 et 6a. Tête et 6^e écusson dorsal de *Acip.* [*Huso*] *Nehelæ* (*id.*, p. 100).
 Fig. 7. Grandes plaques étoilées de *Acip.* (*Antaceus*) *schypa* (*id.*, p. 203).
 Fig. 8. Ecusson dorsal de *Acip.* (*Lioniscus*) *glaber* (Opisthocentre) (*id.*, p. 80 et 261). Voy., en outre, pl. 17, fig. 7.

PLANCHE 21.

Têtes de Lépidostéidés vues en dessus et de profil.

- Fig. 1, 1a, 1b. *Lepidosteus Harlani* (t. II, p. 329).
 Fig. 2, 2a, 2b. *Cylindrosteus Castelnaudii* (*id.*, p. 353).
 Fig. 3, 3a, 3b. *Atractosteus tristæchus* (*id.*, p. 362).
 Voy., en outre, pour les fig. 1a, 2a, 3a, *id.*, p. 306, et pour les fig. 1b, 2b, 3b, *id.*, p. 308; puis p. 294 et 295 pour les différences dans la conformation du rostre, et p. 296 relativement aux dents.

PLANCHE 22.

Lépidostéidés.

- Fig. 1, 1a, 1b. *Atractosteus tropicus* (sous le nom de *Atr. Bocourti*) (*id.*, p. 367).
 Fig. 2, 2a, 2b. *Lepidosteus huronensis* (*id.*, p. 295, 306 et 333).
 Fig. 3. *Lepidosteus louisianensis* (*id.*, p. 295 et 343).
 Voy. pour les différences dans la conformation de la tête, p. 294 et 295.

PLANCHE 23.

Polyptéridés.

- Fig. 1, 1a, 1b. *Polypterus bichir* (t. II, p. 391).
 Fig. 2, 2a, 2b. *Polypterus senegalus* (sous le nom de *Pol. Arnaudii*) (*id.*, p. 394).
 Fig. 3. *Polypterus Endlicherii* (*id.*, p. 393).
 Voyez, relativement aux détails des nageoires dorsales (Fig. 1b et 2b), p. 375.

PLANCHE 24.

- Fig. 1. *Calamoichthys calabaricus* ♂.
- Fig. 1a, 1b. Tête du même vue de profil et en dessus. — Fig. 1c. Extrémité terminale du tronc. — Fig. 1d. L'une des nageoires dorsales. — Fig. 1e et 1f. Rayon épineux de 2 dorsales vu en dessus. — Fig. 1g. Ecailles du tronc et ligne latérale (t. II, p. 397).
Voy. relativement aux nageoires, p. 375.
- Fig. 2. Extrémité terminale du *Calamoichthys calabaricus* ♀ (*id.*, p. 398).
- Fig. 3. Nageoire caudale de Lépidosté (*id.*, p. 296, 304 et 319).
- Fig. 4. Nageoire caudale de très-jeune Lépidosté (*id.*, p. 319).
- Fig. 5. Nageoire caudale d'Esturgeon à fulcres simples. — Fig. 6. Id. de Lépidosté à fulcres doubles (*id.*, p. 296).
- Fig. 7. Ecailles de *Atractosteus spatula* (*id.*, p. 361, et p. 304 pour la ligne latérale).
- Fig. 8. Dents de Lépidostés. Voy. aussi pl. 21 et pl. 22, fig. 2a, 2b et 3 (*id.*, p. 308).


PLANCHE 25.

Amiadés et Lophobranches.


- Fig. 1 et 2. Tête de *Amia reticulata*, de profil et en dessus (t. II, p. 423; p. 411, pour l'appareil operculaire).
- Fig. 3. Système dentaire d'Amie (*id.*, p. 399 et 407).
- Fig. 4. Chiasma des nerfs optiques d'Amie [d'après Franque] (*id.*, p. 404).
- Fig. 5, 5a, 5b. Branchies de Lophobranchie (*id.*, p. 480).


PLANCHE 26.

- Fig. 1, 1a. *Pegasus laternarius* vu en dessus et en dessous. — Fig. 1b. Tête de profil et amplifiée du même (*id.*, p. 491).
- Fig. 2, 2a. *Solenostomus paradoxus* vu de profil et en dessous (*id.*, p. 497). Par erreur, cette fig. n'est pas mentionnée dans le texte.
- Fig. 3. Poche sous-caudale d'un Syngnathe ♂ (*id.*, p. 482).
- Fig. 4. Poche ventrale d'un *Microphis brachyurus* (*id.*, p. 595).
- Fig. 5. Portion de la région ventrale d'un *Nerophis* sur laquelle sont fixés des œufs qui sont représentés à part et grossis et fig. 5a [d'après M. de Quatrefages] (*id.*, p. 483 et 603).



Têtes d'Esturgeons
 1 Sous-génre Antaceus. 2-4 Sous-génre Huso.






Huet del.

Corbié sc.

Têtes d'Esturgeons
 Sous-genres Huso et Acipenser.
 Barbillons et Scutelles cutanées.



Huet del.

Carbié sc.

Têtes d'Esturgeons
Sous-genre *Anlaccus*.














Huet del.

Corbié sc.

1-2 Têtes d'Esturgeons. 3 Polyodon gladius.
 4-6 Ecailles de Lépidostées.



Encéphale, têtes et plaques dorsales d'Esturgeons.




Huet del.





Carbié sc.



Têtes de Lépidostées
 Genres. 1 Lepidosteus. 2 Cylindrosteus. 3 Atractosteus.



BU
LILLE




Finis dact.



Cordis os.

Lépidostéens

1. *Atractosteus Bocourti.*




Blanc del.

Polyptères: 1 P. biclin. 2 P. Annandii. 5 P. Endlicheri.




Corbié sc.





Poissons



Pl. 24.




Blond del.




Carlier sc.

Lépidostéens

1 et 2. *Calamocottus calabarius.*



1-4 Tête. Bouche. Chiasma des nerfs optiques d'Amie.
 5. Branchies de Lophobranchie.



1 Pégase. 2 Solénostome. 5-5 Syngnathes.

Imp. Roret, r. Hautefeuille 12 .